



# አፒሮድ መድኃኒት እና ሕመም፡- እርስዎ ሊያውቁቸው የሚገቡ ነገሮች

ጉዳት ከደረሰብዎ፣ ቀዶ ጥገና ወይም ከባድ የጥርስ ህክምና ከተደረገልዎት፣ ሕመም ሊሰማዎት እንደሚችል ግልጽ ነው። ሕመም የተለመደ የህይወት እና የመዳን ክፍል ነው። አነስተኛ ስጋት ያላቸውን ነገር ግን በይበልጥ ውጤታማ የሆኑ የሕመም ማስታገሻዎችን አስመልክቶ ከሐኪምዎ ጋር ይነጋገሩ።

## ከአፒሮድ ውጭ የሆኑ የሕመም ማከሚያዎች ዝቅተኛ ስጋቶች ነው ያላቸው

በአንድ ወይም በሁለት ሳምንት ውስጥ ለሚጠፋ ሕመም ከአፒሮድ ውጪ በሆኑ የሕመም ማከሚያዎች መጀመር ይመረጣል። አፒሮዶች መጀመሪያ ላይ ሕመምን ለመቆጣጠር ያግዛሉ፣ ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ የግድ አስፈላጊ አይደሉም። ስራውን በተገቢው መንገድ የሚሰሩ ነገር ግን ዝቅተኛ ስጋት ያላቸውን ሌሎች አማራጾች ያስቡ።

- ያለ መድኃኒት ማዘዣ የሚወሰዱ የሕመም ማስታገሻዎች
- ፊዚካል ቴራፒ
- የአካል እንቅስቃሴ
- ሕመም በስሜት ላይ የሚያመጣቸውን ተጽዕኖዎች ለመቋቋም የሚያስችሉ የባለሙያ እርዳታዎች

## አፒሮዶች በሐኪም ትዕዛዝ የሚሰጡ ጠንካራ መድኃኒቶች ናቸው

አፒሮዶች ከካንሰር ወይም ከከባድ የቀዶ ጥገና ለመነጨ ከፍተኛ ሕመም ትክክለኛ አማራጮች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ቫይሮዲን፣ ፔርኮፕት እና ኦክሲኮንቲንን የመሳሰሉ መድኃኒቶች በጣም ሃይለኛ ናቸው እናም ገዳይ ሊሆኑ ይችላሉ። ምንም እንኳን በታዘዘው መሰረት ቢወሰዱም፣ ሁሉም አፒሮዶች ሱስ የማስያዝ እና ከመጠን በላይ የመወሰድ ከፍተኛ የጎንዮሽ ጉዳት አላቸው።

## አፒሮዶች በኬሚካል ባህርያቸው በሄሮይን ቤተሰብ ውስጥ የሚመደቡ ሲሆን በከፍተኛ ሁኔታ ሱስ ያስይዛሉ

ሰውነትዎ ከጊዜ ወደ ጊዜ አፒሮዶችን ስለሚቋቋም፣ በተመሳሳይ ደረጃ ሕመምዎን ለማስታገስ የሚወስዱትን መጠን እየጨመሩ እየጨመሩ መምጣት አለብዎ። አፒሮዶች የሚወሰዱበት መጠን እየጨመረ በመጣ ቁጥር፣ አደገኝነታቸውም ይጨምራል። ለአጭር ጊዜ ከተጠቀሙት በኋላም እንኳን ሱስ ሊይዝዎ ይችላል።

**በተለምዶ የሚታዘዙ የአፒሮድ አይነቶች፡**

ኮዴይን  
ዳይሎዲድ  
ሬንታኒል  
ሃይደርኮዶን (ቫይሮዲን)  
ሃይድሮሞርፎን  
ሚታዶን  
ሜፕሪዶን  
ሞርፊን  
ኤምኤስ ኮንቲን  
አግዚሞርፎር (አፓና)  
አግዚኮንቲን  
ፔርኮፕት

እነዚህ በሐኪም ከሚታዘዙ የአፒሮድ አይነቶች ውስጥ የተወሰኑት ብቻ ናቸው። ለሕመምዎ ማስታገሻ ከታዘዘልዎት ሐኪምዎን አፒሮድ ነው ወይ ብለው ይጠይቁ።

**ለአጭር-ጊዜ ሕመም አፒሮድ ከታዘዘልዎ፡**



የሚታዘዘልዎ መድኃኒት ከሶስት እስከ ሰባት ለሚደርሱ ቀናት የሚሆን አቅርቦት ብቻ መሆን አለበት (ይህ ማለት አብዛኛውን ጊዜ እስከ 10 እንክብሎች ብቻ ማለት ነው)



በተቻለ መጠን ለአጭር ጊዜ አነስተኛ መጠን ብቻ ይጠቀሙ።



ሁልጊዜም ቢሆን አፒሮድ ሳይታዘዘልዎ ሕመምዎን በተሻለ ሁኔታ ሊያስታግሱባቸው ስለሚችሉ ዘዴዎች ከሐኪምዎ ጋር ይነጋገሩ።



የአፒሮድ መድኃኒቶችን መጠቀም እንዳቆሙ፣ ወዲያውኑ ያስወግዷቸው።\*

\*ከጎንዮሽ ካውንቲ ያልተጠቀሙባቸውን መድኃኒቶች በነጻ ሊያስወግዱልዎት የሚችሉ በርካታ የመድኃኒት መደብሮች አሉት። እነዚህ ድረ ገጽ ላይ ለእርስዎ የሚቀርብዎትን ይፈልጉ። [www.takebackyourmeds.org](http://www.takebackyourmeds.org)

# ስለ ኦፕቶሎጂ መረጃዎች እና ቁጥሮች

## የኦፕቶሎጂ ወረርሽኝ

መድኃኒትን ከተገቢው መጠን በላይ መውሰድ በአሜሪካ ውስጥ እና በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ በድንገት ለሚከሰቱ የሞት አደጋዎች መንስዔ በመሆን የመሪነት ቦታውን ይይዛሉ። ኦፕቶሎጂ ደግሞ ወረርሽኙን በግንባር ቀደምትነት እየመራ ይገኛል።

የአሜሪካ የሱስ አሲያኾ መድኃኒቶች ማህበር

**ከ5 መድኃኒትን ከተገቢው መጠን በላይ በመውሰድ ከሚመጡ የሞት አደጋዎች መካከል 3ቱ በኦፕቶሎጂ ምክንያት የሚከሰቱ ናቸው።**  
የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማዕከላት



በአገር አቀፍ ደረጃ፣ **ከ5 አዳዲስ የሄሮይን ተጠቃሚዎች ውስጥ 4ቱ** የጀመሩት በሐኪም የታዘዙ የሕመም ማስታገሻዎችን አላግቡ በመጠቀም ነበር።  
የአሜሪካ የሱስ አሲያኾ መድኃኒቶች ማህበር



**2015** ብቻ፣ ዋሽንግተን ውስጥ **718** ሰዎች ከኦፕቶሎጂ ጋር በተያያዘ መድኃኒትን ከተገቢው መጠን በላይ በመውሰድ ሞተዋል።  
የዋሽንግተን ግዛት የጤና ክፍል



በዋሽንግተን ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ሄሮይን እየተጠቀሙ ካሉ ሰዎች ውስጥ **57%** የሚሆኑት ሄሮይን መጠቀም ከመጀመራቸው በፊት በሐኪም በሚታዘዙ ኦፕቶሎጂ ላይ ጥገና ነበሩ።  
UW የአልኮል እና አግባብ ያልሆነ የዕጽፍ አጠቃቀም ተቋም



## በአስራዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች እና ኦፕቶሎጂ

**በአስራዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ ከሚገኙ 5 ወጣቶች 1ዱ** በአደንዛኾ ዕጾችን ይሞክራሉ።

የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማዕከላት



ሄሮይን ከሚወጡ ወጣቶች መካከል **ግማሽ** የሚሆኑት በሐኪም የታዘዙላቸውን መድኃኒቶች ያላግቡ በመጠቀም የጀመሩ ናቸው።  
ብሔራዊ አግባብ ያልሆነ የዕጽፍ አጠቃቀም ተቋም



በሐኪም የታዘዘን መድኃኒት ያለአግባብ ከተጠቀሙ ህጻናት መካከል **ከ10% 4** የሚሆኑት ከወላጆቻቸው የመድሃኒት ማስቀመጫ መሳቢያ ውስጥ በመውሰድ የጀመሩ ናቸው።  
ከዕጽ ነጻ ለሆኑ ልጆች አጋርነት



**95%** የሚሆኑት ወላጆች ልጆቻቸው የታዘዙላቸውን መድኃኒት ከታለመለት አላማ ውጪ በጭራሽ ወስደው እንደሚያውቁ ያምናሉ።  
ከዕጽ ነጻ ለሆኑ ልጆች አጋርነት



## ሕጻናትን እና በአስራዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ልጆችን ደህንነት መጠበቅ

አንዳንድ ጊዜ ሕጻናት እና በአስራዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ልጆች አላግባብ ኦፕቶሎጂ ይታዘዛቸዋል። ወይም ከሚያስፈልጋቸው መጠን በላይ እንክብሎች ይታዘዛቸዋል። በተጨማሪም በአስራዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ልጆች በመድኃኒት ማስቀመጫ መሳቢያ ውስጥ የሚያገኙትን መድኃኒቶች ሊሞክሩ ይችላሉ።

በተቻለ ጊዜ ሁሉ እነዚህን 3 ቀላል መመሪያዎች ይጠቀሙ።

**1** ለማቆራረጥ 20ዓመት እና ከዚያ በታች ላሉ ለ3 ቀናት ከሚያገኙ አቅርቦት ጠይቅ አይሙሉ (በ.በ.ዛ 10 ኪ.ኒን ማለት ነው)።

**2** ኦፕቶሎጂ ሕጻናት እና ልጆች ከሚደርሱበት ቦታ በጥንቃቄ ያስቀምጡ።

**3** የኦፕቶሎጂ መድኃኒቶችን መጠቀም ሲበቃዎት የተረፉትን በጥንቃቄ ያስወግዷቸው\* እርስዎ ዘንድ አያስምጧቸው።

\*ኪንግ ካውንቲ ያልተጠቀሙባቸውን መድኃኒቶች በነጻ ሊያስወግዱልዎት የሚችሉ ርካታ የመድኃኒት መደቦች አሉት። እዚህ ድረ ገጽ ላይ ለእርስዎ የሚቀርብዎትን ይፈልጉ። [www.takebackyourmeds.org](http://www.takebackyourmeds.org)