

ምንድነው እሱ? የጉድፍ በሽታ(ቫሪሴላ) በቫይረስ የሚመጣ በጣም ተላላፊ በሽታ ነው። የጉድፍ በሽታ ምልክቶች ለበሽታው ከተጋለጡ ከ10-21 ቀናት ውስጥ ይጀምራል ዋናዎቹ ምልክቶች:



የሚታይ ሽፍታ ማሳከክ



የምግብ ፍላጎት ማጣት



በጣም የመድከም ስሜት



ትኩሳት

እንዴት ይሰራጫል?



የጉድፍ በሽታ ያለበት ሰው በሌሎች አካባቢ ካወራ፣ ካሳለ ወይም ወይም ካስነጠሰ



ሌላ ሰው ሽፍታዎችን ወይም የተበከሉ ነገሮችን ከነካ ።

በጠና ለመታመም አደጋ የተጋለጠው ማነው?



ሕፃናት



ጎልማሶችና ወጣቶች



እርጉዝ ሰዎች



ደካማ የመከላከል አቅም ያላቸው ሰዎች

ለሌሎች ከማሰራጨት መቆጠብ የምችለው እንዴት ነው?



እጅዎን በሳሙናና በውሃ ይታጠቡ



ምግብን፣ የቤት ዕቃዎችንና የግል ዕቃዎችን አይጋሩ



አረፋዎችን በጨርቅ ይሸፍኑ



በተደጋጋሚ የሚነኩ ንጣፎችን ያጽዱ



በህመም ጊዜ ቤት ይቆዩና ከሌሎች ይራቁ



የጉድፍ በሽታን ለመከላከል በጣም ጥሩው መንገድ ከትባት ነው።

ህጻናት፣ ወጣቶችና ጎልማሶች ቀድሞውንም የመከላከል አቅም ካልነበራቸው 2 ደዝ ከትባቶች ያስፈልጋቸዋል።



ስለከትባት፣ ከታመሙ ወይም ለጉድፍ በሽታ ከተጋለጡ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ። የበለጠ ለማወቅ kingcounty.gov/cd ይጎብኙ።

ክትባቱ ሰዎችን ከጉድፍ በሽታ ይጠብቃል።

ህጻናት፣ ጎረምሶችና ጎልማሶች ቀድሞውንም የመከላከል አቅም ካልነበራቸው 2 ዶዝ የጉድፍ በሽታ (Varicella) ክትባት ያስፈልጋቸዋል። የጉድፍ በሽታ ካለባቸው ወይም ከዚህ በፊት ከተከተቡ በሽታ የመከላከል አቅም አለዎት።

መከተብ ያለበት ማን ነው?

		
መከተብ ያለበት ማን ነው?	ህጻናትና ታዳጊዎች	ታዳጊ ልጆች
መከተብ ያለበት መቼ ነው?	የመጀመሪያ መጠን: 12-15 ወራት	ሁለተኛ ዶዝ: 4-6 ዓመት

ልጄ ወይም እኔ ከጉድፍ በሽታ ነፃ ካልሆንን ምን ማድረግ አለብኝ?

በጭራሽ ካልተከተቡ ወይም የጉድፍ በሽታ ካለባችሁ ፣ መከላከያ ለማግኘት ጊዜው አልረፈደም! ስለመያዝ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ።

		
መከተብ ያለበት ማን ነው?	ዕድሜያቸው ከ12 ዓመት እና ከዚያ በታች የሆኑ ታዳጊዎች	13 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች
በ#1 እና #2 ዶዝ መከከል ምን ያህል ጊዜ መጠበቅ አለብኝ?	3 ወራት	ከ4-8 ሳምንታት

የጉድፍ ክትባት መውሰድ የሌለበት ማን ነው?



እርጉዝ ሰዎች



አለርጂ ሊሆንባቸው የሚችሉ ሰዎች



ደካማ የበሽታ መከላከያ ወይም ከባድ ሕመም ያለባቸው ሰዎች

የጉድፍ በሽታ ክትባቶች ደህንነታቸው ምን ያህል የተጠበቁ ናቸው?

ለብዙ ሰዎች በጣም ደህንነታቸው የተጠበቀ ነው። እንደ ማንኛውም ሌላ መድሃኒት፣ የጉድፍ ክትባቶች የጎንዮሽ ጉዳዮች ሊኖራቸው ይችላሉ። እነዚህ ብዙውን ጊዜ መለስተኛ ናቸውና በራሳቸው ይጠፋሉ። የጎንዮሽ ጉዳዮች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡



ህመም ክትባቱ በተሰጠበት ቦታ ላይ



መለስተኛ ሽፍታ



ትኩሳት



ስለመከተብ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ።

በአቅራቢዎ ያሉትን የክትባት አማራጮች ለማግኘት kingcounty.gov/findaclinicን ይጎብኙ።