

水痘

(水痘皰疹病毒)

什麼是水痘？ 水痘是一種傳染性極強的病毒性疾病。在接觸後 10 至 21 天開始出現水痘症狀。主要症狀包括：



發癢的水泡皮疹



食欲不振



非常疲倦



發燒

水痘是如何傳播的？



水痘患者說話、咳嗽或打噴嚏時會傳染身邊的其他人。



其他人觸摸水泡或受污染的物體。

誰有患重病的風險？



嬰兒



青少年和成年人



孕婦



免疫系統較弱的人士

如何避免向他人傳播水痘？



用香皂和清水洗手



切勿共用食物、器皿和個人物品



用衣服蓋住水泡



勤清洗被接觸過的表面



患病時居家遠離他人



接種疫苗是預防水痘的最佳方法。

未有免疫力的兒童、青少年和成年人需要接種 2 劑疫苗。



如果您患病或接觸過水痘，請諮詢您的醫療保健提供者接種疫苗。了解更多，請瀏覽 kingcounty.gov/cd。

接種疫苗可保護人們免受水痘的侵襲。

未有免疫力的兒童、青少年和成年人須要接種 2 劑水痘（水痘皰疹病毒）疫苗。如果您曾患上水痘或接種疫苗，您即獲得免疫。

誰應該接種疫苗？

		
誰須要接種疫苗？	嬰兒和幼童	小童
何時接種疫苗？	第 1 劑：12-15 個月	第 2 劑：4-6 歲

如果我或我的孩子沒有水痘免疫力，該怎麼辦？

如果您未曾接種過疫苗或未曾患過水痘，現在獲得保護也不太遲！請諮詢您的醫療保健提供者補充接種疫苗。

		
誰須要接種疫苗？	12 歲及以下的兒童	13 歲及以上的人士
第 1 劑與第 2 劑應相隔多久？	3 個月	4-8 星期

誰不宜接種水痘疫苗？



孕婦



可能存在過敏的人士



免疫系統較弱或患有嚴重疾病的人士

水痘疫苗安全嗎？

對於大部分人士而言，水痘疫苗非常安全。與其它藥物一樣，水痘疫苗也有副作用。這些副作用往往是輕微且能自然消退。副作用可能包括：



接種疫苗的位置
腫痛



輕微紅疹



發燒



請諮詢您的醫療保健提供者接種疫苗。
瀏覽 kingcounty.gov/findaclinic，瞭解您附近的疫苗接種選擇。