

수두 (varicella)

수두란 무엇입니까? 수두는 바이러스에 의해 발생하는 전염성이 매우 강한 질병입니다. 수두의 징후는 바이러스에 노출 후 10-21일 뒤에 나타납니다. 주된 징후는 다음과 같습니다:



가려운 물집 발진



식욕부진



매우 피곤함



발열

어떻게 전염됩니까?



다른 사람들이 주변에 있을 때 수두에 걸린 사람이 말을 하거나 기침, 재채기를 하는 경우.



다른 사람이 물집이나 오염된 물체를 만지는 경우.

심하게 아플 위험이 높은 사람은 어떤 사람입니까?



아기



십대 및 성인



임신부



면역체계가 약한 사람

다른 사람에게 옮기지 않으려면 어떻게 해야 합니까?



비누와 물로 손을 씻으십시오



음식, 식기, 개인용품을 공유하지 마십시오



물집을 옷으로 덮으십시오



자주 만지는 표면을 청소하십시오



아플 때 집에 머물고 다른 사람들과 만나지 마십시오



백신 접종이 가장 좋은 수두 예방법입니다.

어린이, 십대 및 성인은 이미 수두에 면역성이 있는 상태가 아니라면 백신을 2회 접종해야 합니다.



몸이 아프거나 수두에 노출되었다면 의료서비스 제공자에게 백신 접종에 대해 상담하십시오. 자세히 알아보려면 kingcounty.gov/cd를 방문하십시오.

백신 접종은 사람들을 수두로부터 보호합니다.

어린이, 십대 및 성인은 이미 수두에 면역성이 있는 상태가 아니라면 수두(varicella) 백신을 2회 접종해야 합니다. 이전에 수두를 앓았거나 백신을 접종했다면 수두에 면역성이 있습니다.

누가 백신을 접종해야 합니까?

		
누가 백신을 접종해야 합니까?	영유아	어린 아동
언제 백신을 접종합니까?	첫 번째 접종: 12-15개월	두 번째 접종: 4-6세

자녀 또는 본인이 수두에 면역성이 없다면 어떻게 해야 합니까?

수두 백신을 접종한 적이 없거나 수두에 걸린 적이 없더라도 백신을 접종하여 보호를 받기에 늦지 않았습니다! 의료서비스 제공자와 백신 접종에 대해 상담하십시오.

		
누가 백신을 접종해야 합니까?	12세 이하의 어린이	13세 이상의 개인
첫 번째 접종과 두 번째 접종 사이에 얼마나 기다려야 합니까?	3개월	4-8주

수두 백신을 접종하지 않아야 하는 사람은 어떤 사람입니까?



임신부



알레르기가 있을 수 있는 사람



면역체계가 약하거나 질병이 심한 사람

수두 백신은 얼마나 안전합니까?

수두 백신은 대부분의 사람들에게 매우 안전합니다. 다른 약물과 마찬가지로 수두 백신도 부작용이 있을 수 있습니다. 부작용은 대개 경미하고 저절로 사라집니다. 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있습니다.



백신을 접종한 부위의 근육통



경미한 발진



발열



의료서비스 제공자와 백신 접종에 대해 상담하십시오.

근처의 백신 접종 옵션을 알아보려면 kingcounty.gov/findaclinic을 방문하십시오.