

DoxyPEP

La doxiciclina para profilaxis posexposición



Hoja de información

¿Qué es DoxyPEP?

DoxyPEP es también conocido como **la doxiciclina para profilaxis posexposición**. La doxiciclina es un antibiótico comúnmente utilizado para tratar infecciones bacterianas. DoxyPEP puede prevenir ITS (infección de transmisión sexual) bacterianas como sífilis, clamidia y gonorrea cuando se toma después de haber relaciones sexuales sin preservativos.

¿Para quién es DoxyPEP?

DoxyPEP puede ser utilizado por **hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)** y **mujeres transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres** que han tenido una o más ITS en el año anterior. Actualmente, DoxyPEP no se recomienda para mujeres cisgénero.

¿Es eficaz DoxyPEP?



- DoxyPEP es eficaz para prevenir la clamidia, la gonorrea y la sífilis.
- Las investigaciones demostraron que **DoxyPEP redujo el riesgo de contraer gonorrea, clamidia y sífilis en un 65% entre HSH (hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres) y mujeres trans.**
- La DoxyPEP se tolera bien y tiene efectos secundarios mínimos.


¿Cuáles son los beneficios de DoxyPEP?

DoxyPEP previene la clamidia, la gonorrea y la sífilis cuando se toma después de haber mantenido relaciones sexuales sin preservativo. Muchas personas que toman DoxyPEP informan una disminución de la ansiedad y el estigma asociados con las ITS. Para algunas personas, usar DoxyPEP puede empoderarlos, facilitar la actividad sexual de manera positiva y permitirles hacerse cargo de su propia salud sexual.


¿Cuáles son los riesgos de DoxyPEP?

Los riesgos de DoxyPEP pueden incluir:

Efectos secundarios




Sensibilidad al sol



Irritación del esófago y del estómago

Otros posibles riesgos



Resistencia a los antibióticos



Cambios en el microbioma


DoxyPEP puede alterar su microbioma (las bacterias normales que se encuentran en la piel, el estómago y otras partes del cuerpo). Los posibles cambios en su microbioma pueden tener efectos en la salud a largo plazo que actualmente se desconocen.

¿Cómo tomo DoxyPEP?

- **Tome 200 mg de doxiciclina dentro de las primeras 24 horas** - a más tardar 72 horas, después de mantener relaciones sexuales orales, anales o vaginales sin preservativo.
- **No tome** más de 200 mg de doxiciclina en un período de 24 horas.
- DoxyPEP se puede tomar con una frecuencia diaria, dependiendo de la actividad sexual.

¿De qué otra manera puedo protegerme?

DoxyPEP es solo parte de un plan integral de actividades sexuales más seguras. Otras formas adicionales de protegerse del VIH y las ITS **incluyen usar preservativos, hacerse pruebas periódicas de VIH/ITS, tomar PrEP contra el VIH, limitar el número de parejas sexuales y recibir tratamiento para el VIH y las ITS si el resultado es positivo.**



¿Cómo puedo obtener más información sobre DoxyPEP?



Escanee el código QR o [haga clic aquí](#) para ver pautas para el uso de DoxyPEP (en inglés) de Salud Pública – Seattle y el condado de King.

Los riesgos y beneficios de DoxyPEP son complejos. Hable con su proveedor de atención médica si está interesado en tomar DoxyPEP.