

Intercambio de Jeringas

Centro de Seattle

2124 4th Ave., Seattle, WA 98121
(entre las calles Blanchard y Lenora)

206-263-2000

www.kingcounty.gov/needle

Horas de operación

Lunes	9:00am - 7:00pm
Martes	1:00pm - 7:00pm
Miercoles	9:00am - 7:00pm
Jueves	9:00am - 7:00pm
Viernes	9:00am - 7:00pm
Sabado	2:00pm - 5:00pm

- Intercambie tus jeringas usadas por jeringas nuevas y estériles.
- Consigue algodón gratis, cocinantes, toallitas de alcohol y otros suministros de reducción de daños.
- Hazte pruebas de VIH, ETS y hepatitis A, B y C.
- Recibe servicios de salud sin cita previa:

Lunes	1:00pm - 4:30pm
Miercoles	9:00am - 4:30pm
Viernes	9:00am - 4:30pm


Para conocer sitios, servicios y recursos adicionales de intercambio de agujas en el condado de King, visite www.kingcounty.gov/needle.

Algodón

Hechos

y

Recomendaciones



Compartir algodón puede transmitir el VIH, hepatitis B y hepatitis C.



Las esporas y la bacteria crecen en algodones usados.



No guarde algodones usados.



Utilice un pedazo de algodón limpio cada vez que se inyecte.

Siempre utilice un algodón, cocinante (cooker) y una jeringa estéril.



Antes de inyectarse, **lávese** las manos y la parte que va a inyectar con bastante **jabón y agua caliente**. Después limpie el área con **alcohol**.



La fiebre de algodón es causada por la bacteria que vive en el algodón. El algodón puede desarrollar bastante bacteria, especialmente después de mojarse. Utilizando el mismo algodón, puede ponerle bacteria directamente en la sangre. La fiebre de algodón es incómoda, pero no es necesariamente seria.

Los síntomas pueden incluir:

- Escalofrío
- Náusea
- Fiebre
- Vómito
- Sudor inesperado y repentino
- Dolor de cabeza
- Temblor incontrolable
- Falta de aire

Los síntomas normalmente ocurren después de haberse inyectado, pero también puede tomarse hasta una hora. Inyectándose de nuevo no hará que los síntomas desaparezcan. El mejor remedio para la fiebre del algodón es descansar e hidratarse.

Si los síntomas duran más de 3 o 4 horas, o se empeoran, vaya a emergencias. No ignore estos síntomas, especialmente si duran más de lo normal. Obtener atención médica inmediata puede prevenir infecciones graves, coágulos sanguíneos o incluso la muerte.

