

홍역

홍역은 심각한 질병입니다.

홍역은 심각한 질병으로 피부발진과 고열 증상이 일어납니다.

홍역은 전염력이 매우 높고 감염자의 호흡, 기침, 재채기를 통해 타인에게 전염이 됩니다.

예방접종을 받지 않은 사람은 감염되기가 더 쉽습니다.

홍역은 위험한 질병으로 특히 유아와 영아에게 위험한 질병입니다.



홍역으로 부터 가족들을 보호하십시오.

의사들은 모든 어린이들이 MMR 예방접종을 받기를 권장합니다. 만약 성인이 어릴때 MMR 예방접종을 받지 않았다면, 꼭 접종을 받기를 권장합니다.

MMR 예방접종은 매우 안전하며 효과적인 홍역예방법이며, 볼거리와 풍진도 함께 예방합니다. MMR 예방접종을 받는 것이 홍역감염보다 더 안전합니다.

MMR 예방접종 후, 대부분의 어린이들은 부작용을 유발하지 않습니다.

간혹, 발열, 가벼운 발진과 통증을 유발하는 경우도 있으나, 오래가지는 않습니다.



이미지: cdc.gov

MMR 백신접종은 자폐증을 유발하지 않습니다.

자폐증 연구학자들은 가족유전이 자폐증을 유발시키는 것으로 보고 있으며, 환경과의 연관성도 있는지 계속 연구중에 있습니다.

자폐증과 MMR 예방접종과의 연관성은 지금까지 발견되지 않았으며, 전세계 의사들과 과학자들이 계속 연구중에 있습니다.

홍역과 MMR 예방접종에 대해 의문이 있으시면, 담당의사에게 문의하십시오.

더 자세한 정보를 원하시면 아래의 웹사이트를 방문하시길 바랍니다
www.kingcounty.gov/measles

만약 홍역에 감염되었다고 생각하시면, 무엇을 해야 할까요?

홍역 증상들과 감염 경로

홍역은 고열, 기침, 콧물, 결막염을 동반합니다. 3 일~5 일후 얼굴에서 부터 피부발진이 시작되어, 전신으로 번집니다.

홍역 환자는 감염된지 4 일후부터 피부발진이 없어도 전염이 가능하며 피부발진 후 4 일안으로도 점염할수가 있습니다.

홍역 감염자와 같은 장소에 있는 것 만으로도 감염될 수 있으며, 감염자가 떠난 뒤에도, 홍역바이러스는 2 시간 이상 공기중에 살아있습니다.

홍역증상 발생시 즉시 담당의사나 진료기관에 전화하십시오.

담당의사나 진료기관에서 필요에 따라서 당신의 방문 시간을 알려줄 것입니다.

홍역은 매우 전염성이 강하여, 진료기관내 대기실에서 타인에게 전염시킬 수 있기 때문에 진료기관에 가기 전에 증상들을 미리 알려주면, 의료진들이 타인에게 전염을 방지할 수 있는 방법들을 알려줄 겁니다.

홍역감염자는 외출을 삼가하고 집에 있으십시오.

타인들에게 감염시키지 않는 것이 매우 중요합니다.

홍역 감염시 학교, 상점, 타인의 집방문을 하지 마십시오.

또한 귀하나 자녀가 홍역에 감염이 되었다면 타인의 방문도 허락하지 마십시오.

자세한 정보를 원하시면 아래의 웹사이트를 방문하시길 바랍니다 www.kingcounty.gov/measles