

SARAMPO

O SARAMPO É UMA DOENÇA GRAVE

O sarampo é uma doença grave que causa erupção cutânea e febre .

O sarampo é muito contagioso e se espalha quando uma pessoa com sarampo expira, tosse ou espirra.

Quem não está vacinado tem muito mais chances de contrair sarampo.

O sarampo pode ser perigoso, especialmente para bebês e crianças pequenas, podendo causar inchaço do cérebro e infecções pulmonares. Em casos raros, pode ser mortal.



A VACINAÇÃO É A MELHOR FORMA DE PROTEGER SUA FAMÍLIA

A vacina tríplice viral (MMR) é segura e muito eficaz na prevenção do sarampo além de proteger contra caxumba e rubéola.

Os médicos recomendam que todas as crianças recebam a vacina tríplice viral (MMR).

Tomar a vacina tríplice viral (MMR) é mais seguro do que criar anticorpos tendo sarampo.

A maioria das crianças não tem efeitos colaterais da vacina. Os efeitos colaterais que ocorrem geralmente são leves e não duram muito, como febre, erupção cutânea leve e dor .



Imagens: cdc.gov

VACINA TRÍPLICE VIRAL(MMR) NÃO CAUSA AUTISMO

Nenhum estudo encontrou uma ligação entre o autismo e a vacina tríplice viral (MMR). Isso tem sido cuidadosamente estudado por muitos médicos e cientistas pelo mundo.

Os cientistas estão estudando o que torna uma criança mais propensa a ter autismo e a maioria concorda que o autismo provavelmente resulta de uma combinação de genes familiares e eventos antes e depois do nascimento. Isso pode incluir a idade dos pais no momento do nascimento, doença da mãe durante a gravidez ou dificuldades no parto. Eles também estão estudando conexões entre o autismo e ambiente onde a pessoa vive.

Pergunte ao seu médico se tiver dúvidas sobre o sarampo ou sobre a vacina tríplice viral (MMR).

Para mais informações, acesse:
www.kingcounty.gov/measles

Public Health
Seattle & King County



Washington State Department of
Health

O QUE FAZER EM CASO DE SUSPEITA DE CONTÁGIO

Sintomas do sarampo e contágio

Geralmente começa com febre alta, tosse, coriza e olhos vermelhos e lacrimejantes. Depois de 3 a 5 dias, uma erupção cutânea começa no rosto e se espalha para outras partes do corpo.

Você pode espalhar o sarampo para outras pessoas quatro dias antes de ter uma erupção cutânea e quatro dias depois que a erupção apareceu pela primeira vez.

Você pode pegar sarampo apenas por estar em uma sala onde uma pessoa com sarampo esteve. O vírus do sarampo permanece no ar por até duas horas após a pessoa ter saído do local .

Ligue para seu médico ou clínica imediatamente caso apresente sintomas

O seu médico ou clínica irá informá-lo se precisa de uma consulta.

O sarampo é muito contagioso e você não quer contagiar alguém numa sala de espera. É importante dizer ao seu médico ou clínica que você apresenta sintomas de sarampo antes de ir, assim eles lhe darão instruções sobre o que fazer para que você não espalhe o sarampo.

Fique em casa se tiver sarampo

É importante evitar propagar o contágio.

Fique em casa se tiver sarampo. Não vá à escola, ao trabalho, à loja ou à casa de outras pessoas.

Não receba visitas em casa se você ou seu filho tiverem febre ou erupção cutânea .

Para mais informações, acesse: www.kingcounty.gov/measles