

واکسین BCG و معاینات توبرکلوز (TB)

اگر ضرورت به معاینه توبرکلوز (TB) دارید، مهم است بدانید اگر در کودکی واکسین BCG را دریافت کرده اید. حتی در صورت که واکسین شده باشید، هنوز هم میتوانید به توبرکلوز مبتلا شوید، به خصوص اگر در حال حاضر بالغ هستید.

واکسین BCG در برابر بدترین انواع توبرکلوز دوران کودکی محافظت می‌کند. این از شما به عنوان یک بالغ محافظت نمی‌کند.



معاینه توبرکلوز با معاینه خون. واکسین توبرکلوز، که BCG نیز نامیده می‌شود، نتیجه معاینه خون را تغییر نمی‌دهد. اگر در کودکی واکسین BCG داشته‌اید به داکتر خود بگویید که از معاینه پوستی توبرکلوز استفاده نکنند.



اگر مثبت بودن معاینه خون توبرکلوز شما، عکسبرداری با اشعه ایکس قفسه سینه و بازدید داکترها گام بعدی است. داکتر شما تشخیص خواهد داد که آیا شما توبرکلوز غیرفعال دارید یا مرض توبرکلوز فعال.



در ایالات متحده، بسیاری مردم برای درمان توبرکلوز غیرفعال دارو مصرف می‌کنند تا به آنها کمک کند بعداً مریض نشوند. کشورهای دیگر ممکن است برای توبرکلوز غیرفعال دارو تجویز نکنند. ادویه معمولاً 3 تا 4 ماهه دارد.



مردم مبتلا به مرض توبرکلوز فعال احساس مرض می‌کنند و می‌توانند میکروب‌هایی توبرکلوز را به افراد نزدیک خود منتقل کنند. می‌توانید با شماره 206-744-4579، گزینه 1 یا ایمیل با ما تماس بگیرید: برای پرسیدن سوالات، LTBI@kingcounty.gov.