

واکسن BCG و آزمایش‌های سل

اگر نیاز به آزمایش سل دارید، مهم است بدانید که آیا در کودکی واکسن BCG دریافت کرده‌اید یا خیر. حتی اگر واکسینه شده باشید، همچنان ممکن است به سل مبتلا شوید، به‌خصوص اگر اکنون بزرگسال باشید.

واکسن BCG در برابر بدترین انواع سل دوران کودکی محافظت می‌کند. این واکسن در بزرگسالی از شما محافظت نمی‌کند.



با آزمایش خون آزمایش سل دهید. واکسن سل، که BCG نیز نامیده می‌شود، نتیجه آزمایش خون را تغییر نمی‌دهد. اگر در کودکی واکسن BCG زده‌اید، به پزشک خود بگویید که از آزمایش پوستی سل استفاده نکنند.



اگر آزمایش خون سل شما مثبت باشد، عکس‌برداری با اشعه ایکس از قفسه سینه و مراجعه به پزشک گام بعدی است. پزشک شما تشخیص خواهد داد که آیا بیماری سل غیرفعال یا فعال دارید.



در ایالات متحده، افراد زیادی به‌خاطر بیماری سل غیرفعال دارو مصرف می‌کنند تا بعداً بیمار نشوند. در کشورهای دیگر ممکن است برای سل غیرفعال دارو داده نشود. دارو معمولاً 3 تا 4 ماه طول می‌کشد.



افراد مبتلا به بیماری سل فعال احساس بیماری می‌کنند و ممکن است میکروب‌های سل را به افراد نزدیک خود منتقل کنند. می‌توانید از طریق 206-744-4579، گزینه 1 یا این نشانی ایمیل LTBI@kingcounty.gov با ما تماس بگیرید.