

# Вакцина БЦЖ и диагностика туберкулеза



Если возникает необходимость сдать **тест на туберкулез (ТБ)**, важно знать, делали ли вам в детстве прививку БЦЖ. Заболеть туберкулезом можно даже после вакцинации, особенно во взрослом возрасте.



**Вакцина БЦЖ защищает от самых тяжелых форм туберкулеза у детей. Она не защищает вас во взрослом возрасте.**



**Для диагностики ТБ сдайте анализ крови. Вакцина против туберкулеза (БЦЖ) не влияет на результаты анализа крови. Если в детстве вы получили прививку БЦЖ, скажите врачу НЕ проводить кожную пробу на ТБ.**



**Сделать рентгенографию органов грудной клетки и посетить врача — это следующие шаги при получении позитивного результата анализа крови на ТБ. Врач определит, какая у вас форма заболевания, — латентная или активная.**



**В США многие принимают препараты при латентной форме туберкулеза, чтобы позже их состояние не ухудшилось. В других странах человеку с латентным ТБ могут не давать препараты. Как правило, лечение длится от 3 до 4 месяцев.**

Люди, болеющие туберкулезом в активной форме, чувствуют себя плохо и могут передавать туберкулезные бактерии окружающим. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона 206-744-4579, выбрав вариант 1, или пишите на адрес электронной почты: [LTBI@kingcounty.gov](mailto:LTBI@kingcounty.gov).