

Vacuna BCG y pruebas para la TB

Si necesita una **prueba para la tuberculosis (TB)**, es importante saber si recibió la vacuna BCG durante su infancia. Puede contraer TB incluso si recibió la vacuna, especialmente si ahora es una persona adulta.



La vacuna BCG protege a los niños contra los peores tipos de TB infantil. No lo protege siendo adulto.



Hágase una prueba de sangre para detectar la TB. La vacuna contra la TB, también conocida como BCG, no cambia el resultado de una prueba de sangre. Si recibió la vacuna BCG durante su infancia, indíquelo a su médico que NO utilice una prueba cutánea para la TB.



Hágase una radiografía de tórax y visite a un médico si el resultado de la prueba de sangre de TB es positivo. Su médico determinará si tiene TB inactiva o activa.



En los EE. UU., muchas personas toman medicamentos contra la TB inactiva para no enfermarse luego. En otros países, es posible que no se brinden medicamentos para la TB inactiva. Por lo general, la medicación se toma de 3 a 4 meses.

Las personas que tienen TB activa se sienten enfermas y pueden transmitir gérmenes de TB a quienes estén cerca de ellas. Si tiene preguntas, puede llamarnos al 206-744-4579, opción 1, o enviarnos un correo electrónico a LTBI@kingcounty.gov.