

# Вакцина БЦЖ і діагностика туберкульозу

Якщо є потреба зробити **тест на туберкульоз (ТБ)**, важливо дізнатися, чи робили вам у дитинстві щеплення БЦЖ. Захворіти на туберкульоз можна навіть після проведеної вакцинації, особливо в дорослому віці.



**Вакцина БЦЖ захищає від найтяжчих форм дитячого туберкульозу. Вона не захищає вас у дорослому віці.**



**Здайте аналіз крові для діагностики ТБ. Вакцина проти ТБ (БЦЖ) не впливає на результати аналізу крові. Якщо в дитинстві вам робили щеплення БЦЖ, попросіть свого лікаря НЕ проводити шкірну пробу на ТБ.**



**Зробити рентгенографію органів грудної клітки й відвідати лікаря – це подальші дії в разі отримання позитивного результату аналізу крові на ТБ. Лікар визначить, яку ви маєте форму захворювання, – латентну чи активну.**



**У США багато людей із латентним ТБ приймають препарати, щоб їхній стан не погіршився в майбутньому. В інших країнах людям із латентним ТБ можуть не давати препарати. Зазвичай лікування триває від 3 до 4 місяців.**

Люди, болючие туберкулезом в активной форме, чувствуют себя плохо и могут передавать туберкулезные бактерии окружающим. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона 206-744-4579, выбрав вариант 1, или пишите на адрес электронной почты: [LTBI@kingcounty.gov](mailto:LTBI@kingcounty.gov).