

# Vắc-xin BCG và xét nghiệm lao (TB)

Nếu quý vị cần **xét nghiệm lao**, điều quan trọng là cần biết quý vị đã được tiêm vắc-xin BCG khi còn nhỏ chưa. Quý vị vẫn có thể được tiêm ngừa lao cho dù quý vị đã tiêm ngừa, nhất là bây giờ quý vị là người trưởng thành.



**Vắc-xin BCG giúp bảo vệ khỏi các loại bệnh lao tệ nhất thời thơ ấu. Vắc-xin này không giúp bảo vệ quý vị khi trưởng thành.**



**Xét nghiệm máu để tìm bệnh lao. Vắc-xin ngừa lao, hay còn gọi là BCG, không làm thay đổi kết quả xét nghiệm máu. Nếu quý vị đã được tiêm vắc-xin BCG khi còn nhỏ, hãy thông báo với bác sĩ của quý vị KHÔNG sử dụng xét nghiệm lao qua da.**



**Chụp x-quang ngực và thăm khám với bác sĩ là bước tiếp theo nếu kết quả xét nghiệm máu của quý vị là dương tính với bệnh lao. Bác sĩ của quý vị sẽ xác định xem quý vị mắc bệnh lao tiềm ẩn hay bệnh lao hoạt tính.**



**Tại Hoa Kỳ, nhiều người dùng thuốc điều trị bệnh lao tiềm ẩn để giúp họ không mắc bệnh sau này. Các quốc gia khác có thể không sử dụng thuốc để điều trị bệnh lao tiềm ẩn. Sử dụng thuốc thường kéo dài từ 3 đến 4 tháng.**

Những người mắc bệnh lao hoạt tính cảm thấy mệt mỏi và có thể lây truyền vi khuẩn lao sang những người ở gần họ. Quý vị có thể gọi đến cho chúng tôi theo số 206-744-4579, nhấn phím 1, hoặc gửi email đến: [LTBI@kingcounty.gov](mailto:LTBI@kingcounty.gov) nếu quý vị có câu hỏi.