



# ለድብቅ TB መድሃኒት፡- 3HP

ለ12 ሳምንታት መድሃኒትዎን በሳምንት አንድ ጊዜ ይወስዳሉ።

ሳምንታዊ ክሊኖቻችሁን በተመሳሳይ ጊዜ፣ በሳምንት በተመሳሳይ ቀን ይወስዳሉ።

ለድብቅ TB (LTBI) መድሃኒት እየወሰዱ እንደሆነ ለሌሎች ደክተኞችዎ ይገኛሉ።



የቲቢ ኢንፌክሽን አይነት፣ ድብቅ ቲቢ አለዎት። የTB በሽታ የለዎትም እና TBን ወደ ሌሎች ሰዎች ማሰራጨት አይችሉም። ይህ መድሃኒት ንቁ የTB በሽታን ለመከላከል ይረዳል።



ጥያቄዎች ወይም የጎንዮሽ ጉዳዮች ካሉዎትሁ ነርስዎ ጋር ይደውሉ፡-


መድኃኒት	የእንክብሎች ቁጥር	የሳምንቱ ቀን
Isoniazid		ሰ ማ ረ ሐ ሙ ኦ ቅ ዳ እ ሁ
Rifapentine		ሰ ማ ረ ሐ ሙ ኦ ቅ ዳ እ ሁ
Pyridoxine (vit B6)		ሰ ማ ረ ሐ ሙ ኦ ቅ ዳ እ ሁ



መድሃኒትዎን ወዲያውኑ መውሰድ ያቁሙ እና ከዚህ በታች ያሉት ማናቸውም ችግሮች ካጋጠሙዎት የTB ነርስዎ ጋር ይደውሉ፡-

- ትንሽ ወይም ምንም የምግብ ፍላጎት የለም
- የሆድ ህመም ወይም የሆድ ቁርጠት
- ማቅለሽለሽ ወይም ትውከት
- የኮላ-ቀለም ያለው ሽንት ወይም ቀጭን ሰገራ
- የቆዳ ወይም የአይኖች ቢጫ መሆን
- ቀላል ቁስሎች ወይም መድማት
- ሽፍታ ወይም ማሳከክ
- ከባድ አቅም ማነስ ወይም ድካም
- ትኩሳት
- የጭንቅላት ወይም የአካል ህመም
- መፍዘዝ
- በእጅችዎ ወይም በእግሮችዎ ላይ የመንቀጥቀጥ ወይም መደንዘዝ ስሜት

**ማስታወሻ፡- ሽንትዎ፣ ምራቅዎ ወይም እንባዎ ብርቱካናማ ቢሆኑ ምንም ችግር የለውም። ለስላሳ ኮንታክት ሌንሶች ሊበከሉ ይችላሉ።**



### 3ዘዎ ለመውሰድ ጠቃሚ ምክሮች

- መድሃኒትዎን እንዲወስዱ ለማስታወስ ማንቁያ ያዘጋጁ
- ቤተሰብ ወይም ጓደኛ እንዲያስታውስዎ ይጠይቁ
- አልኮል የሚጠጡ ከሆነ ሐኪምዎን ያነጋግሩ፣ አልኮል የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል
- ስለሚወስዱት ሌላ መድሃኒት ለሐኪምዎ ይነገሩ
- ጥያቄዎች ካሉዎት ነርስዎን ይጠይቁ