

أنت مصاب بالسل الكامن، وهو نوع من الإصابة بمرض السل. أنت غير مصاب بمرض السل ولا يمكنك نشر السل إلى الأشخاص الآخرين. سيساعد هذا الدواء في منع الإصابة بمرض السل النشط.



اتصل بالممرضة المعنية بك، إذا كانت لديك أسئلة أو كنت تعاني من آثار جانبية:


دواء السل الكامن: 3HP

ستتناول الدواء الخاص بك مرة واحدة في الأسبوع لمدة 12 أسبوعًا.

ستتناول الحبوب الأسبوعية الخاصة بك معًا في الوقت ذاته، وفي اليوم ذاته من الأسبوع.

أخبر الأطباء الآخرين المعنيين بك بأنك تتناول دواء للسل الكامن (LTBI).

اليوم من الأسبوع	عدد الحبوب	الدواء
الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد		Isoniazid
الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد		Rifapentine
الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد		Pyridoxine (فيتامين ب 6)



نصائح لتناول 3HP

- اضبط منبهًا لتذكيرك بتناول الدواء
- اطلب من أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء تذكيرك
- أخبر الطبيب المعني بك إذا كنت تتناول المشروبات الكحولية، فإنها يمكن أن تتسبب في حدوث آثار جانبية
- أخبر الطبيب المعني بك بالأدوية الأخرى التي تتناولها
- اسأل الممرضة المعنية بك إذا كانت لديك أسئلة

توقف عن تناول الدواء على الفور واتصل بالممرضة المعنية بمتابعة مرض السل لديك، إذا كنت تعاني من أي من المشكلات الواردة أدناه:

- انخفاض الشهية لتناول الطعام أو انعدامها
- اضطراب في المعدة أو تقلصات في المعدة
- الغثيان أو القيء
- بول بلون الكولا أو براز بلون فاتح
- جلد أو عيون صفراء
- سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف
- طفح جلدي أو حكة
- ضعف أو إرهاق شديد
- حمى
- آلام في الرأس أو الجسم
- الدوخة
- وخز أو تنميل في يديك أو قدميك

ملاحظة: إذا تحوّل لون البول، أو اللعاب، أو الدموع لديك إلى اللون البرتقالي، فلا بأس بذلك. وقد تصبح العدسات اللاصقة اللينة ملطخة.