

شما مبتلا به توبرکلوز نهفته، نوعی عفونت توبرکلوز هستید. شما مرض سل ندارید و نمی توانید توبرکلوز را به افراد دیگر منتقل کنید. این ادویه از مرض توبرکلوز فعال جلوگیری می کند.



در صورت داشتن سوال یا عوارض جانبی با نرس خود تماس بگیرید:


ادویه برای توبرکلوز پنهان: 3HP

3HP ادویه خود را یک بار در هفته به مدت 12 هفته ها مصرف خواهید کرد.

گولی های هفتگی خود را همزمان در، همان روز هفته با هم مصرف خواهید کرد.

به داکتران دیگر خود بگویید که برای توبرکلوز نهفته (LTBI) ادویه مصرف می کنید.

روز هفته	تعداد گولی ها	ادویه
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه		Isoniazid
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه		Rifapentine
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه		Pyridoxine (vit B6)



راهنمایی برای استفاده از

- 3HP یک آلارم تنظیم کنید تا به شما یادآوری کند که ادویه خود را می خوری
- از یک خانواده یا دوست بخواهید که به شما یادآوری کند
- در صورت مصرف الکل با داکتر خود صحبت کنید، الکل ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند
- در مورد ادویه های دیگری که می خوری به داکتر خود بگویند
- اگر سوال دارید از نرس تان بپرسید



در صورت داشتن هر یک از مشکلات زیر فوراً مصرف ادویه را توقف کنید و با نرس توبرکلوز تماس بگیرید:

- اشتهای کم یا بی اشتهایی برای غذا
- معده ناراحت یا گرفتگی معده
- تهوع یا استفراغ
- ادرار به رنگ کولا یا مدفوع روشن زرد شدن پوست یا چشم
- کبودی آسان یا خونریزی
- بثورات پوستی یا خارش
- ضعف شدید یا خستگی تب
- درد سر یا بدن
- سرگیچی
- سوزن شدن یا بی حسی در دستها یا پای ها

یادداشت: اگر ادرار، تف یا اشکهای شما نارنجی شود، اشکالی ندارد. لنزهای تماسی نرم ممکن است لکه بردار شوند.