



Traitement médicamenteux contre la tuberculose latente : 3HP

Vous prendrez le médicament une fois par semaine pendant 12 semaines.

Vous prendrez vos cachets une fois par semaine ensemble, à la même heure, le même jour de la semaine.

Informez vos autres médecins que vous prenez un médicament contre la tuberculose latente (LTBI).



Vous êtes atteint de tuberculose latente, une forme d'infection tuberculeuse. Vous n'avez pas la tuberculose et vous ne pouvez pas la transmettre à d'autres personnes. Ce médicament contribue à prévenir la tuberculose active.



Appelez votre infirmière si vous avez des questions ou présentez des effets secondaires :


Médicament	Nombre de cachets	Jour de la semaine
Isoniazid		L Ma Me J V S D
Rifapentine		L Ma Me J V S D
Pyridoxine (vit B6)		L Ma Me J V S D



ARRÊTEZ de prendre votre médicament immédiatement et APPELEZ l'infirmière chargée de votre traitement contre la tuberculose si vous souffrez de l'un des problèmes suivants !

- Peu ou pas d'appétit
- Maux ou crampes d'estomac
- Nausées ou vomissements
- Urine de couleur brunâtre ou selles pâles
- Jaunissement de la peau ou des yeux
- Ecchymoses ou saignements faciles
- Éruption cutanée ou démangeaisons
- Faiblesse ou fatigue importante
- Fièvre
- Maux de tête ou courbatures
- Vertiges
- Fourmillements ou engourdissements au niveau des mains ou des pieds

REMARQUE : Votre urine, votre salive ou vos larmes peuvent prendre une couleur orange, ce n'est pas un problème. Les lentilles de contact souples peuvent également se colorer.



Conseils pour la prise de 3HP

- Réglez une alarme pour vous rappeler de prendre vos médicaments
- Demandez à un proche ou un ami de vous faire penser à prendre vos médicaments
- Si vous consommez de l'alcool, parlez-en à votre médecin, car l'alcool peut causer des effets secondaires.
- Informez votre médecin des autres médicaments que vous prenez
- Adressez toute question à votre infirmière