

تاسو پټ TB لری، د TB یو ډول انفیکشن یا عفونت. تاسو د TB ناروغي نه لری او نورو خلکو ته TB نه شي خپرولی. دا درمل به د فعالې TB ناروغي په مخنيوي کې مرسته وکړي.



که چېرې تاسو پوښتنې یا جانبې اغیزې ولری، نو خپل نرس ته زنگ ووهئ:


د پټ نري رنځ یا TB لپاره درمل: 3HP

تاسو به خپل درمل په اونۍ کې یو ځل د 12 اونيو لپاره وخورئ.

تاسو به خپلې اونيزې گولۍ په همغه یو وخت د اونۍ په ورته ورځ ترلاسه کړئ.

خپلو نورو ډاکټرانو ته وواياست چې تاسو د پټ TB (LTBI) لپاره درمل خورئ.

د اونۍ ورځ	د گوليو شمير	درمل
M T W Th F Sat Sun		ایزونیاژید
M T W Th F Sat Sun		ریفاینتین
M T W Th F Sat Sun		پیریدوکسین (vit B6)



د 3HP اخیستلو لپاره لارښوونې

- یو خبرداری برابر کړئ تر څو تاسو ته د درملو خوړل در په یاد کړي
- له کورنۍ یا ملګري څخه وپوښتنئ چې تاسو ته د درملو خوړل در په یاد کړي
- که چېرې تاسو الکول وڅښئ، نو کیدای شي الکول د جانبي اغیزو لامل وګرځي، نو له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ
- خپل ډاکټر ته د نورو هغو درملو په اړه ووايست چې تاسو یې خوړئ
- که چېرې تاسو پوښتنې یا جانبي اغیزې ولرئ، نو خپل نرس ته زنگ ووهئ:

که چېرې له کومې ستونزې سره مخ شوی، نو سمدلاسه د خپلو درملو خوړل ودریوئ او د TB نرس ته زنگ ووهئ:

- د خوړو لپاره د اشتها کموالی یا نشتوالی
- د معدې درد یا د معدې قبضیت
- التهاب او کانګې
- د کولا رنگ ادرار یا د غایطه موادو مدفوع سپینوالی د
- پوستکي یا د سترګو د رنگ ژیرېدل
- په اسانۍ سره زخمي کېدل یا وینه بهېدل
- بخار یا خارش
- سخته ستړیا او شدید تبه
- تب
- د سر او بدن درد
- د سر ګرځېدل
- د لاسونو یا پښو سستی یا بې حسي

که چېرې تاسو کومه پوښتنه لرئ، نو له خپل نرس څخه پوښتنه وکړئ که چېرې ستاسو ادرار، لعاب، یا اوبنګې نارنجي شي، نو دا کومه ستونزه نه ده. نرم تماس لینډ کیدلی شي داغ لرونکی شي.