



Лечение латентного туберкулеза: режим терапии 3НР

Вы будете принимать препараты один раз в неделю в течение 12 недель.

Вы будете принимать таблетки еженедельно, в одно и то же время, в один и тот же день недели.

Сообщите другим врачам, что вы принимаете препараты для лечения латентного туберкулеза (ЛТБИ).



У вас латентный туберкулез (ТБ), форма туберкулезной инфекции. Вы не больны туберкулезом и не можете передавать его другим людям.

Прием этих препаратов поможет предотвратить развитие активной формы ТБ.



Если у вас возникли вопросы или вы заметили проявление побочных реакций, позвоните медсестре:


Препарат	Количество таблеток	День недели
Isoniazid (Изониазид)		Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс
Rifapentine (Рифапентин)		Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс
Pyridoxine (Пиридоксин), витамин B6		Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс



Немедленно ПРЕКРАТИТЕ прием препаратов и ПОЗВОНИТЕ медсестре-фтизиатру, если у вас возникли любые из перечисленных ниже симптомов:

- Снижение или отсутствие аппетита
- Расстройство желудка или желудочные спазмы
- Тошнота или рвота
- Моча коричневого цвета или жидкий стул Пожелтение кожи или глаз
- Легкое появление синяков или кровотечения
- Сыпь или зуд
- Выраженная слабость или усталость
- Жар
- Головная боль или боль в теле
- Головокружение
- Покалывание в руках или ногах либо их онемение

ПРИМЕЧАНИЕ. Моча, слюна или слезы оранжевого цвета считаются нормой. Мягкие контактные линзы также могут приобрести цвет.



Советы для режима терапии ЗНП

- Установите будильник, который будет напоминать вам о приеме лекарства.
- Попросите о напоминании членов семьи или друга.
- Если вы употребляете алкоголь, сообщите об этом врачу. Из-за алкоголя могут возникнуть побочные реакции.
- Сообщите врачу, какие еще препараты вы принимаете.
- Если у вас возникают вопросы, обращайтесь к медсестре.