



Medicamento para la TB latente: 3HP

Deberá tomar el medicamento una vez por semana durante 12 semanas.

Deberá tomar sus pastillas semanales todas juntas a la misma hora y el mismo día cada semana.

Infórmeles a sus otros médicos que está tomando medicamentos para la tuberculosis (TB) latente (LTBI).




Usted tiene TB latente, un tipo de infección de TB. No tiene la enfermedad de la TB y no puede transmitir la TB a otras personas. Este medicamento lo ayudará a prevenir contraer TB activa.



Llame a su enfermero si tiene preguntas o efectos secundarios:

Medicamento	Cantidad de pastillas	Día de la semana
Isoniazida		Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
Rifapentina		Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
Piridoxina (vit. B6)		Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do



DEJE de tomar el medicamento de inmediato y LLAME a su enfermero de TB si tiene alguno de los problemas descritos a continuación:

- Poco apetito o nada de apetito
- Molestias o dolores estomacales agudos
- Náuseas o vómitos
- Orina de color marrón oscuro o heces livianas
- Piel u ojos de color amarillento
- Sangrado o aparición de hematomas
- Erupción o picazón
- Debilitamiento agudo o fatiga
- Fiebre
- Dolor del cuerpo o de cabeza
- Mareos
- Hormigueo o adormecimiento en manos o pies

NOTA: Es posible que su orina, saliva o lágrimas se vuelvan anaranjadas; esto es NORMAL. Si tiene lentes de contacto blandas, es posible que adquieran cierta coloración o manchas.

Consejos para tomar 3HP

- Ponga una alarma para recordar que debe tomar su medicamento.
- Pídale a un amigo o familiar que se lo recuerde.
- Informe a su médico si toma alcohol, ya que puede causar efectos secundarios.
- Informe a su médico acerca de otros medicamentos que esté tomando.
- Consulte con su enfermero si tiene preguntas.