



Лікування латентного туберкульозу: режим терапії 3НР

Ви прийматимете препарати один раз на тиждень протягом 12 тижнів.

Ви прийматимете таблетки щотижня, в один і той самий час, у визначений день тижня.

Повідомте інших лікарів, що ви приймаєте препарати для лікування латентного туберкульозу (ЛТБІ).



У вас латентний туберкульоз (ТБ), форма туберкульозної інфекції. Ви не хворієте на ТБ і не здатні передавати його іншим людям. Ці препарати допоможуть запобігти розвитку активної форми ТБ.



Якщо ви маєте запитання або помітили прояви побічних реакцій, зателефонуйте медсестрі:


Препарат	Кількість таблеток	День тижня
Isoniazid (Ізоніазид)		Пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд
Rifapentine (Рифапентин)		Пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд
Pyridoxine (Піридоксин), вітамін В6		Пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд



Негайно ПРИПИНІТЬ приймати препарати й ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ медсестрі-фтизіатру, якщо у вас виникли будь-які з наведених нижче симптомів:

- Зниження або відсутність апетиту
- Розлад шлунка або шлункові спазми
- Нудота або блювання
- Сеча коричневого кольору чи рідкі випорожнення
- Пожовтіння шкіри чи очей
- Легка поява синців або кровотечі
- Висипання або свербіж
- Виражена слабкість або втома
- Жар
- Головний біль або біль у тілі
- Запаморочення
- Поколювання в руках і ногах або оніміння кінцівок

ПРИМІТКА. Сечу, слину або сльози помаранчевого кольору вважають нормою. М'які контактні лінзи також можуть набути кольору.



Поради для режиму терапії ЗНР

- Установіть будильник, який нагадуватиме вам прийняти ліки
- Попросіть про нагадування членів родини або друга
- Якщо ви вживаєте алкоголь, повідомте про це лікаря. Алкоголь може спричинити появу побічних реакцій
- Повідомте лікаря, які ще препарати ви вживаєте
- Якщо ви маєте запитання, звертайтеся до медсестри