



ለድብቅ TB መድሃኒት፡- Rifampin (RIF)

ለ4 ወራት መድሃኒትዎን በቀን አንድ ጊዜ ይወስዳሉ።

ዕለታዊ ክሊኖችዎን በተመሳሳይ ጊዜ አንድ ላይ ይወስዳሉ።

ንቁ ላልሆነ TB መድሃኒት እየወሰዱ እንደሆነ ለሌሎች ዶክተሮችዎ ይነገሩ።



የTB ኢንፌክሽን አይነት፣ ድብቅ TB አለዎት። የTB በሽታ የለዎትም እና TBን ወደ ሌሎች ሰዎች ማሰራጨት አይችሉም። ይህ መድሃኒት ንቁ የTB በሽታን ለመከላከል ይረዳል።



ጥያቄዎች ወይም የጎንዮሽ ጉዳዮች ካሉዎትሁ ነርስዎ ጋር ይደውሉ፡-

መድኃኒት	የእንክብሎች ቁጥር
Rifampin	


መድሃኒቶቼን ለ4 ወራት በየቀኑ እወስዳለሁ



መድሃኒትዎን ወዲያውኑ መውሰድ ያቁሙ እና ከዚህ በታች ያሉት ማናቸውም ችግሮች ካጋጠሙዎት የTB ነርስዎ ጋር ይደውሉ፡-

- ትንሽ ወይም ምንም የምግብ ፍላጎት የለም
- የሆድ ህመም ወይም የሆድ ቁርጠት
- ማቅለሽለሽ ወይም ትውከት
- የኮላ-ቀለም ሽንት ወይም ቀጭን ሰገራ
- የቆዳ ወይም የአይኖች ቢጫ መሆን
- ቀላል ቁስሎች ወይም መድማት
- ሽፍታ ወይም ማሳከክ
- ከባድ አቅም ማነስ ወይም ድካም
- ትኩሳት
- የጭንቅላት ወይም የአካል ህመም
- መፍዘዝ
- በአጅቶ ወይም በአግሮቶ ላይ የመንቀጥቀጥ ወይም መደንዘዝ ስሜት

ማስታወሻ፡- የእርስዎ ሽንት፣ ምራቅ ወይም እንባ ብርቱካናማ ቢሆኑ ምንም ችግር የለውም። ለስላሳ ኮንታክት ሌንሶች ሊበከሉ ይችላሉ.



ጠቃሚ ምክሮች ለRIF አወሳሰድ

- መድሃኒትዎን እንዲወስዱ ለማስታወስ ማንቁያ ያዘጋጁ
- በባዶ ሆድዎ መድሃኒትዎን ይውሰዱ
- አልኮል የሚጠጡ ከሆነ ሐኪምዎን ያነጋግሩ፣ አልኮል የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል
- ሌላ ስለሚወስዱት መድሃኒት ለሐኪምዎ ይነገሩ
- ጥያቄዎች ካሉዎት ነርስዎን ይጠይቁ