

أنت مصاب بالسل الكامن، وهو نوع من الإصابة بمرض السل. أنت غير مصاب بمرض السل ولا يمكنك نشر السل إلى الأشخاص الآخرين. سيساعد هذا الدواء في منع الإصابة بمرض السل النشط.



اتصل بالمرضة المعنية بك، إذا كانت لديك أسئلة أو كنت تعاني من آثار جانبية:

# دواء السل الكامن: Rifampin (RIF)


ستتناول الدواء الخاص بك مرة واحدة في اليوم لمدة 4 أشهر.

ستتناول الحبوب اليومية الخاصة بك معًا في الوقت ذاته.

أخبر الأطباء الآخرين المعنيين بك بأنك تتناول دواء للسل غير النشط.

عدد الحبوب في اليوم	الدواء
	Rifampin

**سأتناول الدواء الخاص بي يوميًا  
لمدة 4 أشهر**



## نصائح RIF لتناول

- اضبط منبهًا لتذكيرك بتناول الدواء
- تناول الدواء على معدة فارغة
- أخبر الطبيب المعني بك إذا كنت تتناول المشروبات الكحولية، فإنها يمكن أن تتسبب في حدوث آثار جانبية
- أخبر الطبيب المعني بك بالأدوية الأخرى التي تتناولها
- اسأل الممرضة المعنية بك إذا كانت لديك أسئلة



توقف عن تناول الدواء على الفور واتصل بالممرضة المعنية بمتابعة مرض السل لديك، إذا كنت تعاني من أي من المشكلات الواردة أدناه:

- انخفاض الشهية لتناول الطعام أو انعدامها
- اضطراب في المعدة أو تقلصات في المعدة
- الغثيان أو القيء
- بول بلون الكولا أو براز بلون فاتح
- جلد أو عيون صفراء
- سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف
- طفح جلدي أو حكة
- ضعف أو إرهاق شديد
- حمى
- آلام في الرأس أو الجسم
- الدوخة
- وخز أو تنميل في يديك أو قدميك

**ملاحظة: إذا تحوّل لون البول، أو اللعاب، أو الدموع لديك إلى اللون البرتقالي، فلا بأس بذلك. وقد تصبح العدسات اللاصقة اللينة ملطخة.**