

治疗潜伏性结核病的药物： Rifampin (RIF)



您将在 4 个月内每天服用一次药物。

您将在每天同一时间一起服药。

请告知您的其他医生您正在服用治疗非活动性结核病的药物。

药物	每天的服药数量
Rifampin	

我将在 4 个月内每天都服药



您有潜伏性结核病（这是一种结核病感染）。此时，您并未患有结核病疾病，也不会将结核病传染给其他人。这种药物有助于预防活动性结核病疾病。




如有任何疑问或副作用，请致电医护人员：



如果出现以下问题，请立即停止服药并致电您的结核病医护人员：

- 食欲不振或没有食欲
- 胃部不适或胃痉挛
- 恶心或呕吐
- 可乐色尿液或浅色粪便
- 皮肤或眼睛发黄
- 容易出现瘀伤或出血
- 皮疹或瘙痒
- 严重虚弱或疲倦
- 发烧
- 头部或全身疼痛
- 头晕
- 手或脚出现刺痛或麻木感

注意：如果您的尿液、唾液或眼泪变成橙色，属于正常现象。软性隐形眼镜可能会染上颜色。



服用 RIF 的小贴士

- 设置闹钟以提醒您服药
- 空腹服用您的药物
- 如果您喝了酒，请向医生进行咨询，因为酒精可能会导致副作用
- 请告知医生您所服用的其他药物
- 如果您有任何问题，请向医护人员进行咨询