


ادویه برای توبرکلوز نهفته: (Rifampin)



شما مبتلا به توپرکلوز پهمان، نوعی عفونت سل هستيد. شما مرض توپرکلوز نداريد و نمیتوانيد توپرکلوز را به مردم ديگر منتقل کنید. اين ادويه از مرض توپرکلوز فعال جلوگیری می کند.

ادويه خود را يك بار در هفته به مدت 4 ماهه مصرف خواهيد کرد.

گولی های هفتگی خود را همزمان در ،همان روز هفته با هم مصرف خواهيد کرد.


به داکتران ديگر خود بگوئيد که برای توپرکلوز غير فعال ادويه می خوری.



در صورت داشتن سوال یا عوارض جانبی با نرس خود تماس بگیرید:

تعداد گولی ها در روز	ادويه
	Rifampin

من به مدت 4 ماه هر روز ادويه را می خورم



راهنمایی برای RIF استفاده از

- یک آلام تنظیم کنید تا به شما یادآوری کند که ادویه خود را بخورید
- ادویه خود را با معده خالی بخورید
- در صورت مصرف الکل با داکتر خود صحبت کنید، الکل ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند
- در مورد ادویه های دیگری که می خوری به داکتر خود بگویید
- در صورت که سوال دارید از نرس تان بپرسید



در صورت داشتن هر یک از مشکلات زیر فوراً مصرف ادویه را توقف کنید و با نرس توبرکلوز تماس بگیرید:

- اشتهای کم یا بی اشتهایی برای غذا
- معده ناراحت یا گرفتگی معده
- تهوع یا استفراغ
- ادرار به رنگ کولا یا مدفوع روشن زرد
- شدن پوست یا چشم
- کبودی آسان یا خونریزی
- بثورات پوستی یا خارش
- ضعف شدید یا خستگی تب
- درد سر یا بدن
- سرگیچی
- سوزن شدن یا بی حسی در دستها یا پاها

یادداشت: اگر ادرار، تف یا اشکهای شما نارنجی شود، اشکالی ندارد. لنزهای تماسی نرم ممکن است لکه بردار شوند.