

Médicaments contre la tuberculose latente : Rifampin (RIF)



Vous prendrez votre médicament une fois par jour pendant 4 mois.

Vous prendrez toutes vos pilules en même temps.

Informez vos autres médecins que vous prenez des médicaments contre la tuberculose inactive.

Médicament	Nombre de pilules par jour
Rifampin	

Je prendrai mon médicament tous les jours pendant 4 mois



Ce médicament contribue à prévenir la tuberculose active. Vous n'êtes pas atteint de la tuberculose et vous ne pouvez pas la transmettre à d'autres personnes.




Pour toute question, ou en cas d'effets indésirables, appelez votre infirmière :



ARRÊTEZ immédiatement de prendre votre médicament et
APPELEZ votre infirmière spécialiste de la tuberculose si
vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

- Peu ou pas d'appétit pour la nourriture
- Maux d'estomac ou crampes d'estomac
- Nausées ou vomissements
- Urines de couleur cola ou selles de couleur claire
- Jaunissement de la peau ou des yeux
- Tendance aux ecchymoses, saignements
- Éruption cutanée ou démangeaisons
- Faiblesse ou fatigue importante
- Fièvre
- Maux de tête ou courbatures
- Vertiges
- Fourmillements ou engourdissement dans les mains ou les pieds

REMARQUE : Si votre urine, votre salive ou vos larmes prennent une couleur orange, ce n'est pas un problème. Les lentilles de contact souples peuvent se tacher.



Conseils pour la prise de RIF

- Programmez une alarme pour vous rappeler de prendre votre médicament
- Demandez à un proche ou à un ami de vous faire penser à prendre votre médicament
- Si vous buvez de l'alcool, parlez-en à votre médecin, car l'alcool peut avoir des effets indésirables
- Indiquez à votre médecin tous les autres médicaments que vous prenez
- Pour toute question, demandez conseil à votre infirmière