


دارو برای سل نهفته: ریفامپین (RIF)



شما مبتلا به سل نهفته، نوعی عفونت سل، هستید. شما بیماری سل ندارید و امکان ندارد سل را به دیگران منتقل کنید. این دارو به پیشگیری از ابتلا به بیماری سل فعال کمک خواهد کرد.

داروی خود را یک بار در روز به مدت 4 ماه مصرف خواهید کرد.

قرص‌های روزانه خود را هم‌زمان با هم مصرف خواهید کرد.


به پزشکان دیگر خود بگویید که در حال مصرف دارو برای سل غیرفعال هستید.



اگر با عوارض جانبی مواجه شدید یا سؤالی داشتید، با پرستار خود تماس بگیرید:

تعداد قرص‌ها در روز	دارو
	ریفامپین

داروی خود را هر روز به مدت 4 ماه مصرف خواهیم کرد



متوقف کنید

در صورت داشتن هر یک از مشکلات زیر، فوراً مصرف دارو را متوقف کنید و با پرستار سل تماس بگیرید:

- کم‌اشتهایی یا بی‌اشتهایی
- ناراحتی معده یا گرفتگی عضلات معده
- حالت تهوع یا استفراغ
- ادرار به رنگ کولا یا روشن شدن رنگ مدفوع
- زرد شدن رنگ پوست یا چشم‌ها
- کبودی یا خونریزی آسان
- جوش یا خارش
- ضعف یا خستگی شدید
- تب
- سردرد یا بدن‌درد
- سرگیجه
- گزگز یا بی‌حسی در دست‌ها یا پاها

توجه: اگر ادرار، بزاق یا اشک شما نارنجی شود، مشکلی ندارد. لنزهای تماسی نرم ممکن است لکه‌دار شوند.

نکات برای RIF مصرف

- هشداری تنظیم کنید تا مصرف داروهایتان را یادآوری کند
- داروی خود را با معده خالی مصرف کنید
- اگر الکل مصرف می‌کنید، با پزشک خود صحبت کنید، الکل ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند
- در مورد داروهای دیگری که مصرف می‌کنید به پزشک خود اطلاع دهید
- اگر سؤالی داشتید، از پرستار خود بپرسید