د پټ نري رنځ TB لپاره درمل: ریفامپین (RIF)

تاسو به خپل درمل په ورځ کې یو ځل د 4 میاشتو لپاره وخورئ.

تاسو به خپلې ورځنۍ ګولۍ په همغه یو وخت واخلئ.

خپلو نورو ډاکټرانو ته ووایاست چې تاسو د غیرې فعال TB لپاره درمل خورئ.



تاسو پټه TB لرئ، د TB یو ډول انفیکشن یا عفونت. تاسو د TB ناروغي نه لرئ او نورو خلکو ته TB نه شي خپرولی. دا درمل به د فعالې TB ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي.

که چیرې تاسو پوښتنې یا جانبي اغیزې ولرئ، نو خپل نرس ته زنګ ووهئ:

____

درمل	**د هرې ورځې د ګولیو شمیر**
ریفامپین	

زه به هره ورځ خپل درمل د 4 میاشتو لپاره واخلم

مه يې خورئ

که چېرې له کومې ستونزې سره مخ شوئ، نو سمدلاسه د خپلو درملو خوړل ودروئ او د TB نرس ته زنګ ووهئ:

- د خوړو لپاره د اشتها کموالی یا نشتوالی
- د معدې درد یا د معدې قبضیت
- التهاب او کانګې
- د کولا رنګ ادرار یا د غایطه موادو مدفوع سپینوالی د
- پوستکي یا د سترګو د رنګ ژیړېدل
- په اسانۍ سره زخمي کېدل یا وینه بهېدل
- بخار یا خارښت
- سخته ستړیا او شدیده تبه
- تب
- د سر یا بدن درد
- د سر ګرځېدل
- د لاسونو یا پښو سستي یا بې حسي

که چېرې تاسو کومه پوښتنه لرئ، نو له خپل نرس څخه پوښتنه وکړئ که چېرې ستاسو ادرار، لعاب، یا اوښکې نارنجي شي، نو دا کومه ستونزه نه ده. نرم تماس لینز کیدلی شي داغ لرونکی شي.

د RIF د خوړولو

- لپاره لارښوونې
- الارم ترتیب کړئ تر څو تاسو ته د درملو خوړل در په یاد کړي
- خپل درمل په خالي معده وخورئ
- که چېرې تاسو الکول وڅښئ، کیدای شي الکول د جانبي اغیزو لامل وګرځي، نو له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ
- خپل ډاکټر ته د نورو هغو درملو په اړه وواياست چې تاسو يې خورئ
- که چېرې تاسو پوښتنې نو خپل نرس ته زنګ ووهئ: