

# Medicamento para Tuberculose Latente: Rifampin (RIF)


Vai tomar o seu medicamento uma vez por dia durante 4 meses.

Vai tomar todos os seus comprimidos ao mesmo tempo.

Informe os seus outros médicos que está a tomar medicação para TB inativa.

| Medicação | Número de comprimidos por dia |
|-----------|-------------------------------|
| Rifampin  |                               |

**Vou tomar a minha medicação diariamente durante 4 meses**



Este medicamento vai ajudar a prevenir a doença TB ativa. Não tem a doença da TB e não pode propagar a TB a outras pessoas.



Contacte o/a seu/sua enfermeiro/a em caso de questões ou de efeitos secundários:



PARE imediatamente de tomar a medicação e CONTACTE o/a seu/sua enfermeiro/a no caso de ter os seguintes problemas:

- Pouco ou nenhum apetite
- Dor de estômago ou câimbras abdominais
- Náuseas ou vômitos
- Urina acastanhada ou fezes claras
- Pele ou olhos amarelados
- Fácil formação de hematomas ou sangramento
- Irritação cutânea ou prurido
- Fraqueza severa ou fadiga
- Febre
- Dores de cabeça ou corporais
- Tonturas
- Formigueiro ou dormência nas suas mãos ou pés

**NOTA:** Não há problema se a sua urina, saliva ou lágrimas ficarem laranja. As lentes de contacto podem ficar acastanhadas.



## Sugestões para tomar RIF

- Defina um alarme para o/a recordar de tomar a sua medicação
- Peça a um familiar ou amigo para o/a lembrar
- Fale com o seu médico no caso de beber álcool, uma vez que o álcool pode causar efeitos secundários
- Informe o/a seu/sua médico/a sobre outra medicação que toma
- Contacte o/a seu/sua enfermeiro/a em caso de questões