

Лечение латентного туберкулеза: режим терапии рифампином (RIF)



Вы будете принимать препарат один раз в день в течение 4 месяцев.

Вы будете принимать таблетки ежедневно, в одно и то же время.

Сообщите другим врачам, что вы принимаете препарат для лечения латентного ТБ.

Препарат	Количество таблеток, принимаемых в день
Rifampin (Рифампин)	

Я буду принимать этот препарат ежедневно в течение 4 месяцев



У вас латентный туберкулез (ТБ), форма туберкулезной инфекции. Вы не больны туберкулезом и не можете передавать его другим людям.

Прием этого препарата поможет предотвратить развитие активной формы ТБ.




Если у вас возникли вопросы или вы заметили проявление побочных реакций, позвоните медсестре:



Немедленно ПРЕКРАТИТЕ прием препарата и ПОЗВОНИТЕ медсестре-фтизиатру, если у вас возникли любые из перечисленных ниже симптомов:

- Снижение или отсутствие аппетита
- Расстройство желудка или желудочные спазмы
- Тошнота или рвота
- Моча коричневого цвета или жидкий стул
- Пожелтение кожи или глаз
- Легкое появление синяков или кровотечения
- Сыпь или зуд
- Выраженная слабость или усталость
- Жар
- Головная боль или боль в теле
- Головокружение
- Покалывание в руках или ногах либо их онемение

ПРИМЕЧАНИЕ. Моча, слюна или слезы оранжевого цвета считаются нормой. Мягкие контактные линзы также могут приобрести цвет.



Советы для режима терапии RIF

- Установите будильник, который будет напоминать вам о приеме лекарства.
- Принимайте препарат на пустой желудок.
- Если вы употребляете алкоголь, сообщите об этом врачу. Из-за алкоголя могут возникнуть побочные реакции.
- Сообщите врачу, какие еще препараты вы принимаете.
- Если у вас возникают вопросы, обращайтесь к медсестре.