

# Medicamento para la TB latente: Rifampicina (RIF)



Deberá tomar el medicamento una vez por día durante 4 meses.

Deberá tomar sus pastillas semanales todas juntas a la misma hora.

Infórmeles a sus otros médicos que está tomando medicamentos para la tuberculosis (TB) inactiva.

Medicamento	Cantidad de pastillas por día
Rifampicina	


**Tomaré el medicamento todos los días durante 4 meses.**



Usted tiene TB latente, un tipo de infección de TB. No tiene la enfermedad de la TB y no puede transmitir la TB a otras personas. Este medicamento lo ayudará a prevenir contraer TB activa.



Llame a su enfermero si tiene preguntas o efectos secundarios:



DEJE de tomar el medicamento de inmediato y LLAME a su enfermero de TB si tiene alguno de los problemas descritos a continuación:

- Poco apetito o nada de apetito
- Molestias o dolores estomacales agudos
- Náuseas o vómitos
- Orina de color marrón oscuro o heces livianas
- Piel u ojos de color amarillento
- Sangrado o aparición de hematomas
- Erupción o picazón
- Debilitamiento agudo o fatiga
- Fiebre
- Dolor del cuerpo o de cabeza
- Mareos
- Hormigueo o adormecimiento en manos o pies

**NOTA: Es posible que su orina, saliva o lágrimas se vuelvan anaranjadas; esto es NORMAL. Si tiene lentes de contacto blandas, es posible que adquieran cierta coloración o manchas.**

## Consejos para tomar RIF

- Ponga una alarma para recordar que debe tomar su medicamento.
- Tome su medicamento con el estómago vacío.
- Informe a su médico si toma alcohol, ya que puede causar efectos secundarios.
- Informe a su médico acerca de otros medicamentos que esté tomando.
- Consulte con su enfermero si tiene preguntas.