

Лікування латентного туберкульозу: режим терапії рифампіном (RIF)



Ви прийматимете препарат один раз на день протягом 4 місяців.

Ви прийматимете таблетки щодня, в один і той самий час.

Повідомте інших лікарів, що ви приймаєте препарат для лікування латентного туберкульозу (ТБ).

Препарат	Кількість таблеток на день
Rifampin (Рифампін)	

Я прийматиму цей препарат щодня протягом 4 місяців



У вас латентний туберкульоз, форма туберкульозної інфекції. Ви не хворієте на ТБ і не здатні передавати його іншим людям. Ці препарати допоможуть запобігти розвитку активної форми ТБ.




Якщо ви маєте запитання або помітили прояви побічних реакцій, зателефонуйте медсестрі:



Негайно ПРИПИНІТЬ приймати препарати й ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ медсестрі-фтизіатру, якщо у вас виникли будь-які з наведених нижче симптомів:

- Зниження або відсутність апетиту
- Розлад шлунка або шлункові спазми
- Нудота або блювання
- Сеча коричневого кольору чи рідкі випорожнення
- Пожовтіння шкіри чи очей
- Легка поява синців або кровотечі
- Висипання або свербіж
- Виражена слабкість або втома
- Жар
- Головний біль або біль у тілі
- Запаморочення
- Поколювання в руках і ногах або оніміння кінцівок

ПРИМІТКА. Сечу, слину або сльози помаранчевого кольору вважають нормою. М'які контактні лінзи також можуть набути кольору.



Поради для режиму терапії RIF

- Установіть будильник, який нагадуватиме вам прийняти ліки
- Приймайте препарат натщесерце
- Якщо ви вживаєте алкоголь, повідомте про це лікаря. Алкоголь може спричинити появу побічних реакцій
- Повідомте лікаря, які ще препарати ви вживаєте
- Якщо ви маєте запитання, звертайтеся до медсестри