

Thuốc điều trị bệnh lao tiềm ẩn: Rifampin (RIF)



Quý vị sẽ uống thuốc mỗi ngày một lần trong vòng 4 tháng.

Hàng ngày quý vị sẽ uống các loại thuốc cùng lúc vào cùng thời gian.

Hãy cho các bác sĩ khác của quý vị biết rằng quý vị đang uống thuốc điều trị bệnh lao tiềm ẩn.

Thuốc	Số viên thuốc một ngày
Rifampin	


Tôi sẽ uống thuốc mỗi ngày trong vòng 4 tháng



Quý vị mắc bệnh lao tiềm ẩn, một loại nhiễm trùng lao. Quý vị không mắc bệnh lao và không thể lan truyền bệnh lao cho những người khác. Thuốc này sẽ giúp ngăn ngừa bệnh lao hoạt tính.



Hãy gọi cho y tá nếu quý vị có câu hỏi hoặc tác dụng phụ:



NGỪNG uống thuốc ngay lập tức và GỌI cho y tá chăm sóc lao của quý vị nếu quý vị có bất kỳ vấn đề nào sau đây:

- Ít hoặc không có cảm giác thèm ăn
- Chướng bụng hoặc bụng cồn cào
- Buồn nôn hoặc nôn
- Nước tiểu có màu đỏ nước ngọt hoặc phân có màu sáng
- Da hoặc mắt vàng
- Dễ bầm tím hoặc chảy máu
- Phát ban hoặc ngứa
- Rất yếu hoặc mệt mỏi
- Sốt
- Đau đầu hoặc đau mình mẩy
- Hoa mắt
- Châm chích hoặc tê ở tay hoặc bàn chân

LƯU Ý: Nước tiểu, nước bọt hoặc nước mắt chuyển sang màu cam là điều bình thường. Kính áp tròng mềm có thể bị bẩn.

Những gợi ý sử dụng thuốc RIF

- Đặt đồng hồ để nhắc quý vị uống thuốc
- Uống thuốc khi bụng đói
- Cho bác sĩ của quý vị biết nếu quý vị uống bia rượu vì bia rượu có thể gây ra các tác dụng phụ
- Cho bác sĩ của quý vị biết về các loại thuốc khác mà quý vị đang sử dụng
- Hỏi y tá nếu quý vị có câu hỏi