

ለድብቅ TB መድሃኒት፡- Isoniazid (INH)



ለፃ ወራት መድሃኒትዎን በቀን አንድ ጊዜ ይወስዳሉ

ዕለታዊ ክኒኖችዎን በተመሳሳይ ጊዜ አንድ ላይ ይወስዳሉ

ለድብቅ TB መድሃኒት እየወሰዱ እንደሆነ ለሌሎች ዶክተሮችዎ ይነገሩ።

መድኃኒት	የእንክብሎች ቁጥር
Isoniazid	

መድሃኒቶቼን ለፃ ወራት በየቀኑ እወስዳለሁ



የTB ኢንፌክሽን አይነት፣ ድብቅ TB አለዎት። የTB በሽታ የለዎትም እና TBን ወደ ሌሎች ሰዎች ማሰራጨት አይችሉም። ይህ መድሃኒት ንቁ የTB በሽታን ለመከላከል ይረዳል።




ጥያቄዎች ወይም የጎንዮሽ ጉዳዮች ካሉዎትሁ ነርስዎ ጋር ይደውሉ፡-



መድሃኒትዎን ወዲያውኑ መውሰድ ያቁሙ እና ከዚህ በታች ያሉት ማናቸውም ችግሮች ካጋጠሙዎት የTB ነርስዎ ጋር ይደውሉ፡-

- ትንሽ ወይም ምንም የምግብ ፍላጎት የለም
- የሆድ ህመም ወይም የሆድ ቁርጠት
- ማቅለሽለሽ ወይም ትውከት
- የኮላ-ቀለም ያለው ሽንት ወይም ቀጭን ሰገራ
- የቆዳ ወይም የአይኖች ቢጫ መሆን
- ሽፍታ ወይም ማሳከክ
- በእጅችዎ ወይም በእግሮችዎ ላይ የመንቀጥቀጥ ወይም መደንዘዝ ስሜት



ጠቃሚ ምክሮች ለTB ነርስዎ አወሳሰድ

- መድሃኒትዎን እንዲወስዱ ለማስታወስ ማንቁያ ያዘጋጁ
- ቤተሰብ ወይም ጓደኛ እንዲያስታውስዎ ይጠይቁ
- አልኮል የሚጠጡ ከሆነ ሐኪምዎን ያነጋግሩ፣ አልኮል የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል
- ሌላ ስለሚወስዱት መድሃኒት ለሐኪምዎ ይነገሩ
- ጥያቄዎች ካሉዎት ነርስዎን ይጠይቁ