


ادویه برای توبرکلوز پنهان: Isoniazid (INH)



شما مبتلا به توبرکلوز پنهان، نوعی عفونت سل هستید. شما مرض توبرکلوز ندارید و نمیتوانید سل را به مردم دیگر منتقل کنید. این ادویه از مرض توبرکلوز فعال جلوگیری می کند.

ادویه خود را یک بار در هفته به مدت 9 ماهه مصرف خواهید کرد.

گولی های هفتگی خود را همزمان در، همان روز هفته با هم مصرف خواهید کرد.


به داکتران دیگر خود بگویید که برای توبرکلوز غیر فعال ادویه می خوری.



در صورت داشتن سوال یا عوارض جانبی با نرس خود تماس بگیرید:

تعداد گولی ها در روز	ادویه
	Isoniazid

من به مدت 9 ماهه هر روز ادویه را می خورم



راهنمایی برای استفاده از INH

- یک آلام تنظیم کنید تا به شما یادآوری کند که ادویه خود را بخورید
- از یک خانواده یا دوست بخواهید که به شما یادآوری کند
- در صورت مصرف الکل، با داکتر خود صحبت کنید، الکل ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند
- در مورد ادویه های دیگری که می خوری به داکتر خود بگویید
- در صورت که سوال دارید از نرس شما پرسید



در صورت داشتن هر یک از مشکلات زیر فوراً مصرف ادویه را توقف کنید و با نرس توبرکلوز تماس بگیرید:

- اشتهای کم یا بی اشتهایی برای غذا
- معده ناراحت یا گرفتگی معده
- تهوع یا استفراغ
- ادرار به رنگ کولا یا مدفوع روشن زرد شدن پوست یا چشم
- بثورات پوستی یا خارش
- سوزن شدن یا بی حسی در دستها یا پاها