

Traitement médicamenteux contre la tuberculose latente : Isoniazide (INH)



Vous prendrez le médicament une fois
par jour pendant 9 mois.

Vous prendrez vos cachets tous les
jours à la même heure.

Informez vos autres médecins que vous
prenez un médicament contre la
tuberculose latente.

Médicament	Nombre de cachets par jour
Isoniazid	

**Je prendrai mon médicament
tous les jours pendant 9 mois**



Vous êtes atteint de tuberculose
latente, une forme d'infection
tuberculeuse. Vous n'avez pas la
tuberculose et vous ne pouvez
pas la transmettre à d'autres
personnes. Ce médicament
contribue à prévenir la
tuberculose active.




Appelez votre infirmière si
vous avez des questions
ou présentez des effets
secondaires :



ARRÊTEZ de prendre votre médicament immédiatement et APPELEZ l'infirmière chargée de votre traitement contre la tuberculose si vous souffrez de l'un des problèmes suivants !

- Peu ou pas d'appétit
- Maux ou crampes d'estomac
- Nausées ou vomissements
- Urine de couleur brunâtre ou selles pâles
- Jaunissement de la peau ou des yeux
- Éruption cutanée ou démangeaisons
- Fourmillements ou engourdissements au niveau des mains ou des pieds



Conseils pour la prise d'INH

- Réglez une alarme pour vous rappeler de prendre vos médicaments
- Demandez à un proche ou un ami de vous faire penser à prendre vos médicaments
- Si vous consommez de l'alcool, parlez-en à votre médecin, car l'alcool peut causer des effets secondaires.
- Informez votre médecin des autres médicaments que vous prenez
- Adressez toute question à votre infirmière