

Лечение латентного туберкулеза: режим терапии изониазидом (INH)



Вы будете принимать препарат один раз в день в течение 9 месяцев

Вы будете принимать таблетки ежедневно, в одно и то же время

Сообщите другим врачам, что вы принимаете препарат для лечения латентного ТБ

Препарат	Количество таблеток, принимаемых в день
Isoniazid (Изониазид)	

Я буду принимать этот препарат ежедневно в течение 9 месяцев



У вас латентный туберкулез (ТБ), форма туберкулезной инфекции. Вы не больны туберкулезом и не можете передавать его другим людям.

Прием этого препарата поможет предотвратить развитие активной формы ТБ.




Если у вас возникли вопросы или вы заметили проявление побочных реакций, позвоните медсестре:



Немедленно ПРЕКРАТИТЕ прием препарата и ПОЗВОНИТЕ медсестре-фтизиатру, если у вас возникли любые из перечисленных ниже симптомов:

- Снижение или отсутствие аппетита
- Расстройство желудка или желудочные спазмы
- Тошнота или рвота
- Моча коричневого цвета или жидкий стул
- Пожелтение кожи или глаз
- Сыпь или зуд
- Покалывание в руках или ногах либо их онемение



Советы для режима терапии ИН

- Установите будильник, который будет напоминать вам о приеме лекарства.
- Попросите о напоминании членов семьи или друга.
- Если вы употребляете алкоголь, сообщите об этом врачу. Из-за алкоголя могут возникнуть побочные реакции.
- Сообщите врачу, какие еще препараты вы принимаете.
- Если у вас возникают вопросы, обращайтесь к медсестре.