

# Medicamento para la TB latente: Isoniazida (INH)



Deberá tomar el medicamento una vez por día durante 9 meses.

Deberá tomar sus pastillas semanales todas juntas a la misma hora.

Infórmeles a sus médicos que está tomando medicamentos para la tuberculosis (TB) latente.

Medicamento	Cantidad de pastillas por día
Isoniazida	

**Tomaré el medicamento todos los días durante 9 meses.**



Usted tiene TB latente, un tipo de infección de TB. No tiene la enfermedad de la TB y no puede transmitir la TB a otras personas. Este medicamento lo ayudará a prevenir contraer TB activa.




Llame a su enfermero si tiene preguntas o efectos secundarios:



DEJE de tomar el medicamento de inmediato y LLAME a su enfermero de TB si tiene alguno de los problemas descritos a continuación:

- Poco apetito o nada de apetito
- Molestias o dolores estomacales agudos
- Náuseas o vómitos
- Orina de color marrón oscuro o heces livianas
- Piel u ojos de color amarillento
- Erupción o picazón
- Hormigueo o adormecimiento en manos o pies



## Consejos para tomar INH

- Ponga una alarma para recordar que debe tomar su medicamento.
- Pídale a un amigo o familiar que se lo recuerde.
- Informe a su médico si toma alcohol, ya que puede causar efectos secundarios.
- Informe a su médico acerca de otros medicamentos que esté tomando.
- Consulte con su enfermero si tiene pregunta.