

# Лікування латентного туберкульозу: режим терапії ізоніазидом (INH)



Ви прийматимете препарат один раз на день протягом 9 місяців

Ви прийматимете таблетки щодня, в один і той самий час

Повідомте інших лікарів, що ви приймаєте препарат для лікування латентного туберкульозу (ТБ)

Препарат	Кількість таблеток на день
Isoniazid (Ізоніазид)	

**Я прийматиму цей препарат щодня протягом 9 місяців**



У вас латентний ТБ, форма туберкульозної інфекції. Ви не хворієте на ТБ і не здатні передавати його іншим людям. Ці препарати допоможуть запобігти розвитку активної форми ТБ.




Якщо ви маєте запитання або помітили прояви побічних реакцій, зателефонуйте медсестрі:



Негайно ПРИПИНІТЬ приймати препарати й ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ медсестрі-фтизіатру, якщо у вас виникли будь-які з наведених нижче симптомів:

- Зниження або відсутність апетиту
- Розлад шлунка або шлункові спазми
- Нудота або блювання
- Сеча коричневого кольору чи рідкі випорожнення
- Пожовтіння шкіри чи очей
- Висипання або свербіж
- Поколювання в руках і ногах або оніміння кінцівок



## Поради для режиму терапії ІНН

- Установіть будильник, який нагадуватиме вам прийняти ліки
- Попросіть про нагадування членів родини або друга
- Якщо ви вживаєте алкоголь, повідомте про це лікаря. Алкоголь може спричинити появу побічних реакцій
- Повідомте лікаря, які ще препарати ви вживаєте
- Якщо ви маєте запитання, звертайтеся до медсестри