

Thuốc điều trị bệnh lao tiềm ẩn: Isoniazid (INH)



Quý vị sẽ uống thuốc mỗi ngày một lần trong vòng 9 tháng

Hàng ngày quý vị sẽ uống các loại thuốc cùng lúc vào cùng thời gian

Hãy cho các bác sĩ khác của quý vị biết rằng quý vị đang uống thuốc điều trị bệnh lao tiềm ẩn

Thuốc	Số viên thuốc một ngày
Isoniazid	

Tôi sẽ uống thuốc mỗi ngày trong vòng 9 tháng



Quý vị mắc bệnh lao tiềm ẩn, một loại nhiễm trùng lao. Quý vị không mắc bệnh lao và không thể lan truyền bệnh lao cho những người khác. Thuốc này sẽ giúp ngăn ngừa bệnh lao hoạt tính.




Hãy gọi cho y tá nếu quý vị có câu hỏi hoặc tác dụng phụ:



NGỪNG uống thuốc ngay lập tức và GỌI cho y tá chăm sóc lao của quý vị nếu quý vị có bất kỳ vấn đề nào sau đây:

- Ít hoặc không có cảm giác thèm ăn
- Chướng bụng hoặc bụng cồng cào
- Buồn nôn hoặc nôn
- Nước tiểu có màu đỏ nước ngọt hoặc phân có màu sáng
- Da hoặc mắt vàng
- Phát ban hoặc ngứa
- Châm chích hoặc tê ở tay hoặc bàn chân



Những gợi ý sử dụng thuốc INH

- Đặt đồng hồ để nhắc quý vị uống thuốc
- Đề nghị người thân trong gia đình hoặc bạn bè nhắc quý vị
- Cho bác sĩ của quý vị biết nếu quý vị uống bia rượu vì bia rượu có thể gây ra các tác dụng phụ
- Cho bác sĩ của quý vị biết về các loại thuốc khác mà quý vị đang sử dụng
- Hỏi y tá nếu quý vị có câu hỏi