야토병(툴라레미아)

Public Health
Seattle & King County

야토병이란 무엇입니까? 야토병은 박테리아로 인해 발생하는 심각한 질병일 수 있습니다. 박테리아는 토끼와 설치(쥐)류 등 곤충과 동물들에 서식합니다. 야토병의 징후는 노출 후 1-14일 뒤에 발생할 수 있습니다. 일부 징후는 다음과 같습니다:

갑작스러운 열 및 오한

두통

궤양

쇠약

근육 및 관절 통증

어떻게 전염됩니까?

진드기 또는 사슴파리에게 물림

아프거나 죽은 동물 접촉

오염된 음식이나 물 섭취


박테리아를 들이마심

어떻게 피할 수 있습니까?

동물을 만질 때 장갑을 끼십시오

음식을 완전히 익혀 드십시오

특히 동물을 만진 뒤 손을 씻으십시오

죽은 동물이 있는 곳에서 풀을 베지 마십시오

물이 깨끗한지 확인하십시오

피부에 사용하려면 EPA(미국 환경 보호국)에서 승인한 방충제를 사용하십시오*

* 피부에 사용할 수 있는 EPA 승인 방충제는 DEET, IR3535, 피카리딘, 레몬 유칼립투스 오일(OLE) 등이 있습니다. 의류에는 퍼메트린을 사용하십시오.

진단 및 치료

야토병에 걸렸다고 생각하신다면 의료진과 상담하십시오. 야토병 환자는 가급적 빨리 약물 치료를 받아야 합니다. 이 질병은 치료하지 않으면 치명적일 수 있습니다.

자세히 알아보려면 **www.kingcounty.gov/cd**를 방문하십시오.

Korean
2024년 6월 12일