

Что такое коклюш?

Коклюш (по-английски whooping cough) вызывается бактериями, которые передаются от человека к человеку по воздуху. Распространенные симптомы коклюша:



приступы
кашля



рвота



затрудненное
дыхание

Кто может серьезно заболеть?

Младенцы могут заболеть коклюшем в тяжелой форме. У некоторых детей бывает кашель, но у многих кашля нет вообще. Вместо этого им может быть трудно дышать. Коклюш может привести к госпитализации, пневмонии, поражению мозга и даже смерти.



Что я могу сделать, чтобы защитить себя и других?

Прививку от коклюша можно сделать в любом возрасте, чтобы защитить себя и окружающих.



Младенцы и
маленькие дети

Дети
предподросткового
возраста

Беременные

Взрослые 19
лет и старше

DTaP

Tdap

Tdap

Tdap

в 2, 4 и 6
месяцев
в 15-18 месяцев
в 4-6 лет

в 11-12 лет

в третьем
триместре
каждой
беременности

в любое время
для тех, кто
никогда не
делал
прививку

Как прививка защищает ребенка во время беременности?



Когда вы делаете прививку, организм вырабатывает антитела, которые передаются вашему ребенку. Антитела защищают ребенка в первые месяцы жизни.

Если вы беременны, сделайте прививку в начале третьего триместра беременности. Если вы больны и у вас кашель, не навещайте детей и беременных.

Где можно найти дополнительную информацию?

Поговорите со своим врачом о вакцинации.
Вам нужен врач? Свяжитесь с Community
Health Access Program по телефону 1-800-
756-5437 или по электронной почте:
CHAP@kingcounty.gov.

Чтобы узнать больше
о коклюше, посетите
сайт:
bit.ly/kcpertussis

