

脓疱病

尊敬的家长或监护人，

出于以下原因，我们向您提供此份情况说明书：

- 因为您或您的孩子可能已经接触了脓疱病。
- 仅供参考之用。

关于脓疱病的一般信息

什么是脓疱病？

- 这是一种常见的皮肤感染。
- 有两种细菌会引起脓疱病：A 群链球菌（A 族链球菌）和金黄色葡萄球菌。
- 脓疱病在全年任何时候皆可能发生，但在天气变暖期间尤为高发。

哪些人可能患上脓疱病？

- 任何人都可能感染脓疱病。
- 此病在 2 到 5 岁的儿童中最为常见。

有什么症状？

- 在感染脓疱病之初会出现红色的小斑点，随后变成小水疱。
- 当水疱破溃后，会产生一种粘稠的蜂蜜色分泌物，随后分泌物变干，并在皮肤上形成一层硬痂。
- 水疱会令人感到痛痒。
- 脓疱病最常见于面部，尤其是嘴部和鼻子周围。

脓疱病是如何传播的？

- 引起脓疱病的细菌常见于水疱所含的脓液中。
- 如果人接触到水疱内的脓液，然后用未清洗的双手接触到皮肤上的创口（如切口、溃疡或皮肤上的裂口），那么细菌便会从创口处进入皮肤，然后繁殖，进而导致感染。
 - 抓挠会导致感染面扩大。
- 细菌还可能通过共用衣物、毛巾和床上用品等家居物品来传播。

如何知道我的孩子是否感染了脓疱病？

医疗保健服务提供者可根据皮肤上的疮面外观来确诊是否为脓疱病。

如果您有其他问题或担心您的孩子可能感染脓疱病，请联系您的医疗保健服务提供者。本情况说明书仅提供一般信息。

如果我的孩子感染了脓疱病，该怎么办？

如果您的孩子感染了脓疱病，请立即通知您的儿童保育服务提供者或幼儿园。

如何进行治疗？

- 脓疱病患者必须接受医疗保健服务提供者的诊查。医疗保健服务提供者将开具治疗脓疱的药膏或口服的抗生素。

如何帮助防止脓疱病传播？

- 经常使用肥皂和温水洗手。
 - 脓疱病患者应使用干净的干燥绷带包扎水疱和形成硬痂的部位。
 - 避免接触他人的伤口和绷带。
 - 避免共用个人物品，如毛巾、衣服和毯子。
 - 每天清洗脓疱病患者所穿的衣物、所用的床单和毛巾。
 - 使用肥皂和水彻底清洁儿童可能共用的玩具和其他物品。
 - 对家居表面进行清洁和消毒。
 - 剪短指甲，可有助于防止抓挠和形成疤痕。保持指甲清洁有助于避免皮肤感染。
-

我的孩子是否需要留在家里不去托儿所？

是的。患有脓疱病的孩子需要呆在家中。在满足下列条件的情况下，可以返回托儿所：

- 开始使用抗生素后满 24 小时；
- 包扎溃疡处；
- 感觉良好，可以参加课堂活动。

请遵循您的儿童保育计划制定的疾病政策。

参考资料

American Academy of Pediatrics

- Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools, 6th Edition. pages 123-124

Centers for Disease Control & Prevention

- Impetigo: All You Need to Know. <https://www.cdc.gov/groupastrep/diseases-public/impetigo.html>