

膿皰病

尊敬的家長或監護人，

出於以下原因，我們向您提供此份情況說明書：

- 因為您或您的孩子可能已經接觸了膿皰病。
- 僅供參考之用。

關於膿皰病的一般資訊

什麼是膿皰病？

- 這是一種常見的皮膚感染。
- 有兩種細菌會引起膿皰病：A 群鏈球菌（A 族鏈球菌）和金黃色葡萄球菌。
- 膿皰病在全年任何時候皆可能發生，但在天氣變暖期間尤為高發。

哪些人可能患上膿皰病？

- 任何人都可能感染膿皰病。
- 此病在 2 到 5 歲的兒童中最為常見。

有什麼症狀？

- 在感染膿皰病之初會出現紅色的小斑點，隨後變成小水皰。
- 當水皰破潰後，會產生一種粘稠的蜂蜜色分泌物，隨後分泌物變乾，並在皮膚上形成一層硬痂。
- 水皰會令人感到痛癢。
- 膿皰病最常見於面部，尤其是嘴部和鼻子周圍。

膿皰病是如何傳播的？

- 引起膿皰病的細菌常見於水皰所含的膿液中。
- 如果人接觸到水皰內的膿液，然後用未清洗的雙手接觸到皮膚上的創口（如切口、潰瘍或皮膚上的裂口），那麼細菌便會從創口處進入皮膚，然後繁殖，進而導致感染。
 - 抓撓會導致感染面擴大。
- 細菌還可能透過共用衣物、毛巾和床上用品等家居物品來傳播。

如何知道我的孩子是否感染了膿皰病？

醫療保健服務提供者可根據皮膚上的瘡面外觀來確診是否為膿皰病。

如果您有其他問題或擔心您的孩子可能感染膿皰病，請聯絡您的醫療保健服務提供者。本情況說明書僅提供一般資訊。

如果我的孩子感染了膿皰病，該怎麼辦？

如果您的孩子感染了膿皰病，請立即通知您的兒童保育服務提供者或幼稚園。

如何進行治療？

- 膿皰病患者必須接受醫療保健服務提供者的診查。醫療保健服務提供者將開具治療膿皰的藥膏或口服的抗生素。

如何幫助防止膿皰病傳播？

- 經常使用肥皂和溫水洗手。
 - 膿皰病患者應使用乾淨的乾燥繃帶包紮水皰和形成硬痂的部位。
 - 避免接觸他人的傷口和繃帶。
 - 避免共用個人物品，如毛巾、衣服和毯子。
 - 每天清洗膿皰病患者所穿的衣物、所用的床單和毛巾。
 - 使用肥皂和水徹底清潔兒童可能共用的玩具和其他物品。
 - 對家居表面進行清潔和消毒。
 - 剪短指甲，可有助於防止抓撓和形成疤痕。保持指甲清潔有助於避免皮膚感染。
-

我的孩子是否需要留在家裡不去幼稚園？

是。患有膿皰病的孩子需要呆在家中。在滿足下列條件的情況下，可以返回托兒所：

- 開始使用抗生素後滿 24 小時；
- 包紮潰瘍處；
- 感覺良好，可以參加課堂活動。

請遵循您的兒童保育計劃的疾病政策。

參考資料

American Academy of Pediatrics

- Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools, 6th Edition. pages 123-124

Centers for Disease Control & Prevention

- Impetigo: All You Need to Know. <https://www.cdc.gov/groupastrep/diseases-public/impetigo.html>