

الحصبة: ما الذي ينبغي لبرامج رعاية الأطفال والتعليم المبكر، والأسر معرفته

يمكن أن تتسبب الحصبة فيما يلي لدى الرضع والأطفال الصغار:

التهاب الرئة



تورم المخ (التهاب الدماغ)



الوفاة



مرض الحصبة هو مرض مُعدٍ بشدة.

من الممكن أن تتعرض لفيروس الحصبة حتى بعد مغادرة الشخص المُصاب به للغرفة أو المنطقة.

يُصاب به 9 من كل 10 أشخاص لم يحصلوا على التطعيم ضد الحصبة إذا تواجد في الغرفة شخص واحد فقط مصاب به

يمكن أن يظل الفيروس حيًّا في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين

يحتاج الأطفال إلى الحصول على جرعتين من اللقاح الثلاثي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR):

يؤمّن الحصول على جرعتين حماية ضد الإصابة بالحصبة بنسبة 97%.

وتستمر هذه الحماية مدى العمر.

الجرعة الأولى 12 شهرًا

الجرعة الثانية 4 سنوات

إن الحصول على لقاح MMR في الوقت المحدد هو أفضل وسيلة للوقاية ضد الإصابة بالحصبة، وتجنب الحاجة إلى البقاء في المنزل عند وجود حالة مصابة بالفيروس.

من قد يلزمهم البقاء في المنزل هم:

- الرضع الأصغر من 12 شهرًا
- أي شخص مُعفى من تلقي لقاح MMR
- أي شخص لم يكمل جرعات لقاح MMR
- الموظفون والمتطوعون غير القادرين على تقديم سجل تلقيهم لقاح MMR أو ما يثبت إصابتهم بالحصبة سابقًا



قد يحتاج أي شخص إلى البقاء في المنزل لمدة تصل إلى 21 يومًا في كل مرة يتعرض فيها للحصبة.

البرامج: الإبلاغ عن أي حالات إصابة بالحصبة على الفور إلى جهة الترخيص أو إلى السلطة الصحية المحلية. بالنسبة إلى مقاطعة كينج، يُرجى الاتصال على الرقم 206.296.4774.

الأسر: أبلغ البرنامج على الفور إذا أصيب طفلك بالحصبة.

