

麻疹：儿童保育和早期学习计划及家庭需要了解的信息

麻疹具有极强传染性。

即使麻疹患者已离开该房间或区域，您仍可能接触到麻疹病毒。

病毒可在空气中存活长达两小时

若室内有一人感染麻疹，则未接种疫苗者被传染的几率高达 90%


婴幼儿感染麻疹可能导致：



肺炎



脑肿胀（脑炎）



死亡

儿童需接种两剂麻疹、腮腺炎、风疹混合疫苗 (MMR)：

第一剂

12 个月龄

第二剂

4 岁

接种两剂疫苗即可达到 97% 的麻疹预防效果。

这种预防效果将持续终身。

及时接种 MMR 疫苗是预防麻疹的最佳方式，亦可避免在出现病例时被要求居家隔离。



每次接触麻疹病例后，可能需要居家隔离长达 21 天。

可能需要居家隔离的人群包括：

- 月龄未满 12 个月的婴儿
- 任何持有豁免接种 MMR 疫苗证明者
- 未完成最后一剂 MMR 疫苗接种者
- 无法提供 MMR 疫苗接种记录或麻疹感染证明的员工和志愿者

计划：立即向经营许可证发放单位及当地卫生管辖部门通报任何麻疹病例。若处于 King 县境内，请致电 206.296.4774。**家长：**若您的孩子感染麻疹，请立即向您参与的计划报告。