

# 麻疹：

兒童保育和早期學習計劃及  
家庭需要瞭解的資訊

## 麻疹具有極強傳染性。

即使麻疹患者已離開該房間或區域，您仍可能接觸到麻疹病毒。

病毒可在空氣中  
存活長達兩小時

若室內有一人感染麻疹，則未接種疫苗者被傳染的幾率高達 90%

嬰幼兒感染麻疹可能導致：



肺炎



腦腫脹（腦炎）



死亡

兒童需接種兩劑麻疹、腮腺炎、風疹混合疫苗 (MMR)：

第一劑

12 個月齡

第二劑


4 歲

接種兩劑疫苗即可  
達到 97% 的麻疹預防效果。

這種預防效果將持續終身。



及時接種 MMR 疫苗是預防麻疹的最佳方式，亦可避免在出現病例時被要求居家隔離。



每次接觸麻疹病例後，可能需要居家隔離長達 **21 天**

可能需要居家隔離的人群包括：

- 月齡未滿 12 個月的嬰兒
- 任何持有豁免接種 MMR 疫苗證明者
- 未完成最後一劑 MMR 疫苗接種者
- 無法提供 MMR 疫苗接種記錄或麻疹感染證明的員工和志工

計劃：立即向經營許可證發放單位及當地衛生管轄部門通報任何麻疹病例。若處於 King 縣境內，請致電 206.296.4774。家長：若您的孩子感染麻疹，請立即向您參與的計劃報告。