

传染性软疣

尊敬的家长或监护人：

您收到以下资料便览是因为：

- 您或您的孩子可能接触过传染性软疣。
- 仅供参考。

关于传染性软疣的一般资讯

什么是传染性软疣？

- 传染性软疣是由感染皮肤顶层的痘病毒引起的。
- 是一种常见的皮肤感染，会导致皮肤出现圆形、无痛的小颗粒。
- 患有传染性软疣的人更有可能将其传播到自己身体的其他部位，而不是另一个人。

谁会感染它？

- 任何人都可能患上传染性软疣。
- 在1至10岁的儿童中最常见。

它有哪些症状？

- 主要症状为皮肤上出现小颗粒。小颗粒通常是肉色、白色、黄色或透明，中央微凹。
- 儿童通常会在脸上、背部、胸部、手臂和腿部出现小颗粒。
- 成年人经常在下腹部、生殖器和大腿内侧出现小颗粒。
- 小颗粒通常是无痛的，但有时会发痒并发炎。
- 小颗粒可能持续 2 到 3 个月。

它是如何传播的？

- 病毒存在于皮肤上的小颗粒中。
- 当小颗粒被抓破时，病毒会传播到身体的其他部位，从而导致更多的小颗粒生长。
- 如果一个人触摸完皮肤上的小颗粒不洗手再触摸别人的皮肤，就可以把病毒传播给别人。
- 它也可以通过分享个人物品来传播，例如化妆品、毛巾和毯子。

我怎么知道我的孩子是否患有传染性软疣？

医疗保健提供者可以通过观察皮肤上的小颗粒来诊断传染性软疣，有时候也可以采集小颗粒的样本，再用显微镜观察。

如果您有其他问题或担心您的孩子患有传染性软疣，请联系您的医疗保健提供者。
本资料便览仅提供一般资讯。

如果我的孩子患有传染性软疣怎么办？

如果您的孩子患有传染性软疣，请立即通知您的托儿所或学前班。

如何治疗？

- 小颗粒通常会自行消失不留疤痕。所有小颗粒通常在大约 6 到 18 个月内消失，但也可能长达 4 年。
- 出现分散开或单个小颗粒的儿童不需要接受治疗。
- 请与您的医疗保健提供者商量治疗方案。

如何帮助防止传染性软疣的传播？

- 避免与感染者进行皮肤接触。
 - 避免共用个人物品，如毛巾、衣服和肥皂。
 - 经常洗手，尤其是在触摸小颗粒后。
 - 避免抓挠或抠小颗粒，因为这会将小颗粒扩散到身体的其他部位。
 - 尽可能保持小颗粒清洁、干爽，并用衣服或绷带覆盖。
-

我的孩子需要离开托儿所并留在家里吗？

不需要。接触过或被诊断出患有传染性软疣的儿童可以继续去托儿所。

请遵守您孩子托儿所的疾病政策。

参考资料：

American Academy of Pediatrics

- *Caring for our Children, Chapter 3 Health Promotion and Protection, 3.6 Management of Illness, 3.6.1 Inclusion/Exclusion Due to Illness*
- *Caring for our Children, Chapter 7 Infectious Diseases, 7.5 Skin and Mucous Membrane Infections, 7.5.7 Molluscum Contagiosum*
- *Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools, 5th Edition. Page 127*

Centers of Disease Control & Prevention

- *Molluscum Contagiosum website <https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/1/atp-safelinks.html>*

Child Care Health Program – Public Health Seattle & King County

- <https://kingcounty.gov/depts/health/child-teen-health/child-care-health/disease-prevention.aspx>.
Disease Prevention Website