

傳染性軟疣

尊敬的家長或監護人：

您收到以下資料便覽是因為：

- 您或您的孩子可能接觸過傳染性軟疣。
- 僅供參考。

關於傳染性軟疣的一般資訊

什麼是傳染性軟疣？

- 傳染性軟疣是由感染皮膚頂層的痘病毒引起的。
- 是一種常見的皮膚感染，會導致皮膚出現圓形、無痛的小顆粒。
- 患有傳染性軟疣的人更有可能將其傳播到自己身體的其他部位，而不是另一個人。

誰會感染它？

- 任何人都可能患上傳染性軟疣。
- 在1至10歲的兒童中最常見。

它有哪些症狀？

- 主要症狀為皮膚上出現小顆粒。小顆粒通常是肉色、白色、黃色或透明，中央微凹。
- 兒童通常會在臉上、背部、胸部、手臂和腿部出現小顆粒。
- 成年人經常在下腹部、生殖器和大腿內側出現小顆粒。
- 小顆粒通常是無痛的，但有時會發癢併發炎。
- 小顆粒可能持續 2 到 3 個月。

它是如何傳播的？

- 病毒存在於皮膚上的小顆粒中。
- 當小顆粒被抓破時，病毒會傳播到身體的其他部位，從而導致更多的小顆粒生長。
- 如果一個人觸摸完皮膚上的小顆粒不洗手再觸摸別人的皮膚，就可以把病毒傳播給別人。
- 它也可以通過分享個人物品來傳播，例如化妝品、毛巾和毯子。

我怎麼知道我的孩子是否患有傳染性軟疣？

醫療保健提供者可以通過觀察皮膚上的小顆粒來診斷傳染性軟疣，有時候也可以採集小顆粒的樣本，再用顯微鏡觀察。

如果您有其他問題或擔心您的孩子患有傳染性軟疣，請聯繫您的醫療保健提供者。
本資料便覽僅提供一般資訊。

如果我的孩子患有傳染性軟疣怎麼辦？

如果您的孩子患有傳染性軟疣，請立即通知您的托兒所或學前班。

如何治療？

- 小顆粒通常會自行消失不留疤痕。所有小顆粒通常在大約 6 到 18 個月內消失，但也可能長達 4 年。
- 出現分散開或單個小顆粒的兒童不需要接受治療。
- 請與您的醫療保健提供者商量治療方案。

如何幫助防止傳染性軟疣的傳播？

- 避免與感染者進行皮膚接觸。
 - 避免共用個人物品，如毛巾、衣服和肥皂。
 - 經常洗手，尤其是在觸摸小顆粒後。
 - 避免抓撓或摳小顆粒，因為這會將小顆粒擴散到身體的其他部位。
 - 盡可能保持小顆粒清潔、乾爽，並用衣服或繃帶覆蓋。
-

我的孩子需要離開托兒所並留在家裡嗎？

不需要。接觸過或被診斷出患有傳染性軟疣的兒童可以繼續去托兒所。

請遵守您孩子托兒所的疾病政策。

參考資料：

American Academy of Pediatrics

- *Caring for our Children, Chapter 3 Health Promotion and Protection, 3.6 Management of Illness, 3.6.1 Inclusion/Exclusion Due to Illness*
- *Caring for our Children, Chapter 7 Infectious Diseases, 7.5 Skin and Mucous Membrane Infections, 7.5.7 Molluscum Contagiosum*
- *Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools, 5th Edition. Page 127*

Centers of Disease Control & Prevention

- *Molluscum Contagiosum website <https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/1/atp-safelinks.html>*

Child Care Health Program – Public Health Seattle & King County

- <https://kingcounty.gov/depts/health/child-teen-health/child-care-health/disease-prevention.aspx>.
Disease Prevention Website